Aciclovir, tableta, 400 mg, vía oral, código IGSS: 126

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento agudo del herpes zoster. Tratamiento de episodios iniciales y el manejo de episodios recurrentes de herpes genital. Tratamiento de la varicela.

Reacciones adversas: Malestar**,** Náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza dolor abdominal, agresión/confusión, agitación, alopecia, anafilaxia, anemia, angioedema, anorexia, ataxia, coma, coagulación intravascular diseminada, mareo, fatiga.

Precauciones de uso: Púrpura trombocitopénica/síndrome urémico hemolítico, que ha provocado la muerte, ha ocurrido en pacientes inmunocomprometidos que recibían terapia con aciclovir. Ajustar la dosis cuando se administre a pacientes con insuficiencia renal.

Precaución cuando se administra a pacientes que reciben agentes potencialmente nefrotóxicos ya que esto puede aumentar el riesgo de disfunción renal y/o el riesgo de síntomas reversibles del sistema nervioso central.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a aciclovir o valaciclovir.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.