Ciclosporina microemulsión, cápsula, 25 mg, vía oral, código IGSS: 2008

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Profilaxis del rechazo de órganos en riñones, hígado y trasplantes alogénicos de corazón.
Debe administrarse en combinación con corticosteroides suprarrenales.
Tratamiento del rechazo crónico en pacientes tratados previamente con otros agentes inmunosupresores.

Reacciones adversas: Temblor, nefrotoxicidad, hipertensión, infección, dolor de cabeza, náuseas, hirsutismo, hipertricosis, trastorno reproductivo femenino, hiperplasia de las encías, triglicéridos aumentados, molestias abdominales, infección del tracto respiratorio superior, diarrea, dispepsia, calambres en las piernas, parestesia, acné, convulsiones, prurito, hiperpotasemia, hipomagnesemia, pancreatitis, hepatotoxicidad, síndrome gripal.

Precauciones de uso: Solo médicos con experiencia en terapia inmunosupresora y manejo de pacientes con trasplante de órganos deben recetar ciclosporina.
Debe administrarse con corticosteroides suprarrenales, pero no con otros agentes inmunosupresores.
Mayor susceptibilidad a la infección y posible desarrollo de linfoma puede resultar de la inmunosupresión.
Monitorear a intervalos repetidos concentraciones de ciclosporina en sangre y los ajustes de dosis subsiguientes para evitar la toxicidad debido a altas concentraciones y posible rechazo de órganos debido a la baja absorción de ciclosporina, de especial importancia en trasplantes hepáticos.

Vacunación puede ser menos efectiva y vacunas vivas atenuadas no deben administrarse.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o excipientes, función renal anormal.
Lactancia materna, uso concomitante con alquitrán de hulla, metotrexato y otros inmunosupresores.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.