Clonazepam, solución oral 2.5 mg/ ml, frasco gotero 10 ml, vía oral, código IGSS: 2048

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: La mayoría de las formas clínicas de la epilepsia del lactante y del niño, especialmente: El pequeño mal típico o atípico, las crisis tónico-clónicas generalizadas, primarias o secundarias. Está igualmente indicado en las epilepsias del adulto y las crisis focales, así como en el "status" epiléptico en todas sus manifestaciones clínicas.

Reacciones adversas: Somnolencia, coordinación anormal, ataxia, depresión, mareos, fatiga, deterioro de la memoria, infección de las vías respiratorias superiores, confusión, disartria, rinitis, tos, frecuencia urinaria, impotencia, disminución de la libido, aumento de la salivación, empeoramiento de las convulsiones tónico-clónicas.

Precauciones de uso: Se han notificado casos de ideación y comportamiento suicida en pacientes en tratamiento con antiepilépticos para varias indicaciones.
Sistema nervioso central, psicosis y depresión:
Debe administrarse con especial precaución en pacientes con ataxia. Las benzodiazepinas no están recomendadas para el tratamiento primario de enfermedad psicótica. Pacientes con historial de depresión y/o intentos de suicidio deben mantenerse bajo estrecha supervisión.
Insuficiencia hepática:
Las benzodiazepinas pueden contribuir a precipitar episodios de encefalopatía hepática. Deben tomarse precauciones especiales cuando se administra a pacientes con alteración hepática de leve a moderada.
Miastenia gravis:

Como con cualquier sustancia con efecto depresor del sistema nervioso central y/o propiedades relajantes musculares, debe tenerse especial precaución cuando se administra en pacientes con miastenia gravis. Debe evitarse el uso concomitante con alcohol y/o depresores del sistema nervioso central.

Cuando se administran benzodiazepinas, se conocen reacciones paradójicas como inquietud, agitación, irritabilidad, agresividad, ansiedad, engaño, enfado, pesadillas nocturnas, alucinaciones, psicosis, alteraciones del comportamiento y otros comportamientos adversos.

Si esto ocurre, se debe interrumpir el uso del medicamento. Estas reacciones paradójicas son más comunes en niños y pacientes de edad avanzada. Puede ocurrir amnesia anterógrada cuando se administran benzodiazepinas a dosis terapéuticas, el riesgo se incrementa a dosis más altas.

La dosis debe ajustarse con precaución individualmente en pacientes con enfermedad preexistente del sistema respiratorio (por ejempo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica), así también en epilepsia.

En lactantes y niños pequeños, puede causar un aumento de la producción de saliva y secreción bronquial. Por tanto, es preciso prestar especial atención en mantener las vías respiratorias libres.

El riesgo de dependencia, que aumenta en relación directa con la dosis y la duración del tratamiento, es especialmente elevado en los pacientes con antecedentes de alcoholismo y/o drogadicción.

Contraindicaciones: Historia de hipersensibilidad a las benzodiacepinas. Evidencia clínica o bioquímica de enfermedad hepática significativa. Glaucoma agudo de ángulo estrecho.

No debe utilizarse en pacientes en coma, o pacientes con farmacodependencia, drogodependencia o dependencia alcohólica.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.