Diclofenaco resinato, suspensión oral al 1.5%, frasco gotero de 15 ml - 20 ml, vía oral, código IGSS: 174

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Está indicado en el tratamiento sintomático de procesos inflamatorios, dolorosos y en síndrome febril.

Reacciones adversas: Trombocitopenia, leucopenia, anemia (incluye anemiahemolítica y aplásica), agranulocitosis, angioedema, desorientación, depresión, insomnio, pesadillas, irritabilidad, trastornos psicóticos, parestesias, trastornos de lamemoria, convulsiones, ansiedad, temblores, meningitis aséptica, disgeusia, accidente cerebrovascular, deficiencia visual, vista borrosa, diplopía, acúfenos, déficit auditivo, hipertensión, vasculitis, neumonitis, colitis.
Hipersensibilidad, reacciones anafilácticas y anafilactoides, sonmolencia, asma, gastritis, hemorragia gastrointestinal, hematemesis, diarrea hemorrágica, melena, úlcera gastrointestinal.
Cefalea o mareo, vértigo, náuseas, vómitos, diarrea, dispepsia, abdominalgia, flatulencia, falta de apetito.

Precauciones de uso: Se han registrado hemorragias, úlceras o perforaciones gastrointestinales, ocasionalmente mortales y pueden manifestarse en cualquier momento del tratamiento, con o sin síntomas premonitorios o antecedentes de eventos gastrointestinales graves. Presencia de un ligero aumento del riesgo de eventos trombóticos cardiovasculares graves (como el infarto de miocardio o el accidente cerebrovascular).

Se recomienda exclusivamente para el tratamiento a corto plazo. Si aun así se usa durante un periodo prolongado, se recomienda vigilar el recuento sanguíneo, como con cualquier otro antiinflamatorio no esteroideo.
En los pacientes asmáticos, los siguientes efectos son más frecuentes que en otros pacientes: rinitis alérgica estacional, inflamación de la mucosa nasal (por ejemplo, pólipos nasales), neumopatías obstructivas crónicas o infecciones crónicas de las vías respiratorias (especialmente cuando se asocian con síntomas parecidos a los de la rinitis alérgica), reacciones producidas por los antiinflamatorios no esteroideos como agudizaciones asmáticas (la denominada intolerancia a los analgésicos o síndrome de asma por analgésicos), edema de Quincke o urticaria.
Aumento de las enzimas hepáticas y retención de líquidos y edema en pacientes con enfermedad renal.

Contraindicaciones: No se debe administrar a personas con antecedentes de hipersensibilidad al diclofenaco o en personas que hayan desarrollado asma, urticaria, angiodema, broncoespasmo, rinitis severa.
No se debe usar Diclofenaco en el periodo inmediato a una cirugía de by-pass coronario. Con la administración de ácido acetilsalicilico u otros analgésicos no esteroidales. Pacientes con úlcera gastroduodenal activa.
No administrar a niños menores de un año.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.
Lactancia:

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.