Dutasteride, tableta o cápsula, 0.5 mg, Vía oral, código IGSS: 10533

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de los síntomas de moderados a graves de la hiperplasia benigna de próstata.
Reducción del riesgo de retención aguda de orina y de cirugía en pacientes con síntomas de hiperplasia prostática benigna de moderados a graves.

Reacciones adversas: Impotencia, disminución de la libido, trastorno de la eyaculación, trastornos mamarios, Mareo, frecuencia no definida, falla cardiaca, cáncer de próstata (alto grado).

Precauciones de uso: Antes de iniciar el tratamiento, descartar otras afecciones urológicas.
Uropatía obstructiva, enfermedad hepática.
El paciente no debe donar sangre hasta 6 meses después de la última dosis de dutasterida.
La dutasterida reduce el antígeno prostático específico sérico entre un 40% y un 50%; establecer un nuevo antígeno prostático específico de referencia después de 3 a 6 meses de tratamiento.
Monitorear cambios cardíacos o insuficiencia cardíaca.
Las cápsulas no deben ser manipuladas por mujeres que estén o puedan estar embarazadas; el fármaco puede absorberse a través de la piel y podría provocar una exposición fetal no deseada y un riesgo potencial para el feto masculino; si una mujer embarazada entra en contacto con cápsulas de dutasterida con fugas, el área de contacto debe lavarse inmediatamente con agua y jabón; El fármaco se puede absorber a través de la piel según estudios en animales.

Cáncer de próstata y tumores de alto grado:

El estudio REDUCE, un ensayo clínico de 4 años, analizó el efecto de la dutasterida en hombres con riesgo de cáncer de próstata. Se observó una mayor incidencia de cánceres de próstata de alto grado en hombres tratados con dutasterida en comparación con placebo. Sin embargo, la relación exacta entre la dutasterida y estos cánceres no está clara. Por lo tanto, se recomienda monitorear regularmente a los pacientes bajo tratamiento con dutasterida para detectar cáncer de próstata.

Antígeno prostático específico:

El antígeno prostático específico es crucial para detectar el cáncer de próstata. Dutasterida reduce los niveles de antígeno prostático específico en suero en aproximadamente un 50% después de 6 meses de tratamiento.

Se recomienda establecer un nuevo antígeno prostático específico basal después de 6 meses y monitorear regularmente. Cualquier aumento confirmado del antígeno prostático específico durante el tratamiento podría indicar cáncer de próstata. Sin embargo, el tratamiento no afecta el uso del antígeno prostático específico como herramienta diagnóstica una vez establecido un nuevo nivel basal. Los niveles de antígeno prostático específico regresan a la línea de base después de 6 meses de suspender el tratamiento. El cociente antígeno prostático específico libre/total se mantiene constante bajo la influencia del tratamiento. No se necesitan ajustes si se utiliza el porcentaje de antígeno prostático específico libre para la detección del cáncer de próstata. Antes y durante el tratamiento, se deben realizar exámenes rectales y otras evaluaciones para detectar posibles problemas prostáticos.

Cáncer de mama: en casos raros, se ha informado de cáncer de mama en hombres que toman dutasterida, tanto en ensayos clínicos como en la fase posterior a la comercialización. Sin embargo, estudios epidemiológicos no han mostrado un aumento del riesgo de cáncer de mama en hombres que utilizan inhibidores de la 5-alfa reductasa. Se recomienda que los médicos instruyan a sus pacientes a comunicar cualquier cambio en el tejido mamario, como bultos o secreción del pezón, de inmediato.

Cápsulas rotas: cápsulas rotas de dutasterida pueden ser absorbidas por la piel, por lo que se recomienda que mujeres, niños y adolescentes eviten el contacto con ellas. En caso de contacto, se debe lavar la zona afectada con agua y jabón inmediatamente.
Insuficiencia hepática: dutasterida no se ha estudiado en pacientes con alteraciones hepáticas. Se debe tener cuidado en la administración de dutasterida en pacientes con insuficiencia hepática de leve a moderada.

Contraindicaciones: Pacientes con hipersensibilidad al principio activo, otros inhibidores de la 5-alfa reductasa o a algunos de los excipientes incluidos.
Mujeres, niños y adolescentes.
Pacientes con insuficiencia hepática grave.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.