Ebastina, tableta, 20mg, vía oral, código IGSS:10588

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento sintomático de rinitis alérgica (estacional y perenne) asociada o no a conjuntivitis alérgica, urticaria crónica idiopática y dermatitis alérgica.

Reacciones adversas: Dolor de cabeza, somnolencia, boca seca, reacciones de hipersensibilidad, nerviosismo, insomnio, mareo, hipoestesia, disgeusia, palpitaciones, taquicardia, dolor abdominal, vómitos, náuseas, dispepsia, hepatitis, colestasis, pruebas analíticas de función hepática anómalas, urticaria, erupción, cutánea, dermatitis, trastornos menstruales, edema y astenia.

Precauciones de uso: Pacientes con riesgo cardíaco conocido tales como pacientes con prolongación del intervalo QT, hipocalemia, tratamiento concomitante con medicamentos que incrementen el intervalo QT o que inhiban el enzima CYP3A4, tales como antifúngicos azólicos como ketoconazol e itraconazol y antibióticos macrólidos como eritromicina.
En pacientes con insuficiencia hepática grave no se han realizado estudios con dosis superiores a 10 mg, por lo que en estos pacientes no debe excederse la dosis máxima recomendada (10 mg de ebastina/día).

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.