Bromuro de Ipratropio, Bromhidrato de Fenoterol, solución, Suspensión para inhalación, frasco presurizado con válvula dosificadora, 10 ml, Vía inhalación, código IGSS: 10585

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso:
Indicado en la prevención y tratamiento de los síntomas de las enfermedades obstructivas crónicas de las vías aéreas con limitación reversible del flujo aéreo, tales como asma bronquial y especialmente de bronquitis crónica con o sin enfisema (enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC).

Reacciones adversas: Tos, sequedad bucal, dolor de cabeza, temblor, faringitis, náuseas, mareos, disfonla, taquicardia, palpitaciones, vómitos, aumento de la presión arterial sistólica y nerviosismo.
Nerviosismo, dolor de cabeza, temblor, mareos, taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, palpitaciones, faringitis, disfonía, vómitos, náuseas, sequedad bucal, retención urinaria, aumento de la presión arterial sistólica
Reacción anafiláctica, hipersensibilidad, hipokalemia, agitación, trastorno mental, glaucoma, aumento de la presión intraocular, trastornos de la acomodación, midriasis, visión borrosa, dolor ocular, edema corneal, hiperemia conjuntival, visión de halos, arritmia, fibrilación auricular, taquicardia supraventricular, isquemia miocárdica, broncoespasmo, irritación de la garganta, edema faríngeo, laringoespasmo, broncoespasmo paradojal, sequedad de garganta, estomatitis, glositis, trastornos de la motilidad gastrointestinal, diarrea, constipación, edema

bucal, urticaria, erupción, prurito, angioedema, hiperhidrosis, debilidad muscular, espasmos musculares, mialgia, disminución de la presión arterial diastólica.
Sobredosificación:
Palpitaciones, taquicardia, temblor fino en las manos, hipertensión, hipotensión, disminución de la amplitud del pulso, dolor de pecho, arritmias y enrojecimiento facial.

Precauciones de uso: Si durante la inhalación se experimenta un empeoramiento de la falta de aire o fatiga, se recomienda consultar a un médico de manera inmediata.
En pacientes con asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) leve.
Se sugiere utilizar el medicamento solo cuando sea necesario (sintomático) en lugar de manera regular. Se debe considerar la incorporación o aumento de la terapia antiinflamatoria inhalada para controlar la inflamación bronquial, prevenir el deterioro del asma bronquial y de la EPOC que responde a los esteroides.
Un aumento en la dependencia de medicamentos que contienen p2-simpatomiméticos, sugiere un empeoramiento de la condición. En tal caso, se recomienda que el médico reevalúe el plan de tratamiento y considere una nueva estrategia terapéutica.

En las siguientes condiciones debe ser usado luego de un análisis riesgo/beneficio cuidadoso, especialmente cuando se recomiendan altas dosis: diabetes mellitus insuficientemente controlada, infarto agudo de miocardio reciente, enfermedades vasculares o cardíacas severas, hipertiroidismo y feocromocitoma.
Se han observado efectos cardiovasculares con medicamentos simpaticomiméticos. Existe evidencia limitada de casos raros de isquemia miocárdica asociada con beta-agonistas, según datos post comercialización y literatura. Pacientes que utilizan Bromuro de Ipratropio, Bromhidrato de Fenoterol; y tienen enfermedad cardíaca severa deben consultar a su médico si experimentan dolor en el pecho u otros síntomas de empeoramiento de la enfermedad cardíaca.

Prestar atención a los síntomas como disnea y dolor de pecho es crucial, ya que pueden indicar origen cardíaco o respiratorio.

Existe riesgo potencial de hipokalemia, especialmente en pacientes con terapia con p2 adrenérgicos.

Los signos de glaucoma de ángulo estrecho incluyen dolor ocular, visión borrosa, visión en halos o imágenes coloreadas, ojos rojos con congestión conjuntival y edema corneal. Ante la aparición de estos síntomas, se debe iniciar el tratamiento con drogas mióticas y buscar atención médica especializada de inmediato.

Se debe utilizar con precaución en pacientes con predisposición al glaucoma de ángulo estrecho u obstrucción de las vías urinarias preexistente.

Complicaciones oculares, como midriasis, aumento de la presión ocular y glaucoma, han sido reportadas, por lo que es importante seguir las instrucciones de aplicación.

Los pacientes con fibrosis quística pueden ser más propensos a trastornos de la motilidad gastrointestinal. Después de la administración se pueden presentar reacciones de hipersensibilidad, como urticaria, angioedema y broncoespasmo. Su uso durante competencias atléticas da resultado positivo en las pruebas no clínicas de abuso de drogas.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a alguno de los componentes u otros derivados de atropina. No usarse en caso de cardiopatías con contracción muscular de la salida del ventrículo izquierdo (cardiomiopatía obstructiva hipertrófica) y aceleración de la frecuencia cardíaca con pulso irregular (taquiarritmias).

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.