Metilergonovina (Metilergometrina), tableta, 0.125 mg - 0.2 mg, Vía oral, código IGSS: 1000

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento rutinario de la atonía uterina, la hemorragia y subinvolución del útero. Para el control de la hemorragia uterina en la segunda etapa del trabajo de parto después de salida del hombro anterior.

Reacciones adversas: Náuseas, vómitos, mareo, dolor de cabeza, tinnitus, diaforesis, palpitación, dolor de pecho transitorio, disnea, tromboflebitis, hematuria, intoxicación por agua, alucinaciones, calambres en las piernas, congestión nasal, diarrea, mal gusto, fenómenos alérgicos, incluido el shock, hipertensión.

Precauciones de uso: Precaución en presencia de sepsis, enfermedad vascular obliterante. Precaución durante la segunda etapa del trabajo de parto. La necesidad de extracción manual de una placenta retenida debe ocurrir sólo en raras ocasiones con la técnica adecuada y el tiempo adecuado para su separación espontánea. No administrar rutinariamente por vía intravenosa por posibles problemas hipertensivos y cerebrovasculares. Pacientes con enfermedad arterial coronaria o factores de riesgo por susceptibilidad a desarrollar isquemia miocárdica o infarto asociado con vasoespasmo.

Contraindicaciones: Hipertensión, enfermedades cardíacas, toxemia, embarazo, hipersensibilidad, estenosis de la válvula mitral, uso prolongado
Casos de amenaza de aborto espontáneo. Evitar durante la lactancia.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.