Mupirocina, ungüento o crema al 2%, tubo de 20 g, vía tópica, código IGSS: 2074

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Infecciones primarias, tales como impétigo, foliculitis, forunculosis y ectima.
Infecciones secundarias, tales como dermatitis atópica, dermatitis eccematosa y dermatitis de contacto sobreinfectadas y lesiones traumáticas infectadas, siempre que su extensión sea limitada.

Reacciones adversas: Dolor de cabeza, náuseas, ardor, escozor, dolor, picazón, erupción cutánea, celulitis, piel seca, eritema, exudado incrementado, dolor o sangrado secundario al eccema, infección secundaria de la herida, hinchazón, sensibilidad, urticaria. Dolor abdominal, mareo y estomatitis ulcerosa.

Precauciones de uso: En caso de sensibilización o irritación local grave durante el uso de este medicamento, se debe interrumpir el tratamiento, retirar el producto y establecer un tratamiento alternativo.
El uso prolongado puede provocar crecimiento excesivo de organismos no sensibles.
Se debe suspender el tratamiento y realizar una revisión completa en casos de diarrea prolongada, significativa o calambres abdominales.
En casos de insuficiencia renal moderada o grave, no se debe utilizar en condiciones que permitan la absorción de grandes cantidades de polietilenglicol.
Debe administrarse exclusivamente por vía cutánea, evitando el contacto con los ojos y en caso de contacto, lavar cuidadosamente con agua.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes, uso oftálmico, uso intranasal (existe una formulación específica para esta vía de administración).
Uso en el lugar de inserción de un catéter venoso central.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.