Subsalicilato de bismuto, suspensión frasco, 262 mg/15 ml, frasco 120 ml, vía oral, código IGSS: 2087

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso:

Diarrea leve inespecífica, terapia coadyuvante de la erradicación de Helicobacter Pylori, tratamiento de la diarrea del viajero.

Reacciones adversas: Nausea**,** diarrea, dolor abdominal, melena, infección del tracto respiratorio superior, constipación, anorexia, vómitos, astenia, cefalea, dispepsia, somnolencia, ulcera duodenal, sinusitis, cambios en las heces, flatulencia, hemorragia gastrointestinal, dolor anal, parestesia, ansiedad, tinnitus, debilidad, impactación fecal, depresión, espasmos musculares, neurotoxicidad, ennegrecimiento temporal de lengua y heces, acúfenos.

Precauciones de uso: Se debe usar con precaución en pacientes con deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, coagulopatía, ulcera péptica, diabetes mellitus, insuficiencia hepática y/o renal.

El fármaco puede provocar oscurecimiento de las heces y lengua, el cual es reversible al detener el mismo, prestar atención y no confundir con melena.

No se debe usar en niños o adolescentes que están en periodo de recuperación de varicela o gripe. Si se observan cambios de comportamiento, vómitos o nausea puede ser signos tempranos de Síndrome de Reye, se debe contactar con un médico inmediatamente y detener el tratamiento.

Dosis elevadas pueden causar neurotoxicidad.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al compuesto, aspirina u otros salicilatos. Úlcera péptica sangrante, insuficiencia renal, hemofilia, diarrea infecciosa, fiebre alta, enfermedad de Von Willebrand, melena.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.