Ribavirina, solución oral, 100 mg/ 5 ml, frasco 100 ml, vía oral, código IGSS: 81

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de la hepatitis C crónica en pacientes de 3 años de edad y mayores con enfermedad hepática compensada, en combinación con interferón alfa-2b (pegilado y no pegilado).

Reacciones adversas: Fatiga, dolor de cabeza, hemólisis, mialgia, náuseas, rigores, fiebre, insomnio, disminución de hemoglobina, depresión, hiperbilirrubinemia, artralgia, alopecia, irritabilidad, dolor musculoesquelético, erupción, anorexia, mareos, prurito, síndrome seudogripal, disnea, congestión nasal, dispepsia, concentración deteriorada, trombocitopenia, sinusitis, vómitos, labilidad emocional, disminución de glóbulos blancos; recuento absoluto de neutrófilos <500 /mm^3, anemia hemolítica, debilidad, dolor de pecho, perversión del gusto, nerviosismo.

Precauciones de uso: Debe ser administrado con alimentos.
Toxicidad embriofetal, defectos de nacimiento, aborto espontáneo o muerte fetal pueden ocurrir. Los pacientes deben tener una prueba de embarazo negativa antes de la terapia y usar métodos anticonceptivos y someterse a pruebas de embarazo periódicas.
Los pacientes que presenten las siguientes condiciones deben ser monitoreados de cerca y puede requerir una reducción de la dosis o la interrupción de la terapia:
La anemia hemolítica puede ocurrir con una caída inicial significativa en hemoglobina.
Pancreatitis.

Síntomas pulmonares, que incluyen disnea, infiltrados pulmonares, neumonitis, hipertensión pulmonar y neumonía, así como infiltrados pulmonares o alteración de la función pulmonar han sido reportados.
Trastornos oftalmológicos nuevos o que empeoran.
Disminuciones severas en los recuentos de neutrófilos y plaquetas, y anomalías hematológicas, endocrinas (p. ej., hormona estimulante de la tiroides) y hepáticas.
Trastornos dentales/periodontales informados con la terapia combinada.
Administración concomitante de azatioprina debido a la posible aparición de pancitopenia y supresión de la médula ósea.
Pérdida de peso e inhibición del crecimiento informados durante la combinación de la terapia en pacientes pediátricos. Inhibición del crecimiento a largo plazo (altura)ha sido reportado en algunos pacientes.
No se permite la monoterapia con ribavirina.

Esterilidad:
Basado en datos de animales, la droga puede afectar la fertilidad masculina; en estudios con animales, estos efectos fueron en su mayoría reversibles a los pocos meses de suspender el fármaco.

Contraindicaciones: Mujeres que están o pueden quedar embarazadas.
Hombres cuyas parejas femeninas están embarazadas.
Reacciones de hipersensibilidad conocidas a la ribavirina (p. ej., síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, eritema multiforme).
Hepatitis autoinmune.
Hemoglobinopatías (p. ej., talasemia mayor, anemia de células falciformes).
Aclaramiento de creatinina <50 ml/min.
Coadministración con didanosina.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.