Ribavirina, tableta o cápsula, 200 mg, vía oral, código IGSS: 156

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso:
Tratamiento de la hepatitis C crónica en pacientes de 3 años de edad y mayores con enfermedad hepática compensada, en combinación con interferón alfa-2b (pegilado y no pegilado).

Reacciones adversas: Fatiga, Dolor de cabeza, Hemólisis, Mialgia, Náuseas, Rigores, Fiebre, Insomnio, Disminución de hemoglobina, Depresión, Hiperbilirrubinemia , Artralgia, Alopecia, Irritabilidad, Dolor musculoesquelético, Erupción, Anorexia, Mareos, Prurito, Síndrome seudogripal, Disnea, Congestión nasal, Dispepsia, Concentración deteriorada, Trombocitopenia, Sinusitis, Vómitos, Labilidad emocional, Disminución de glóbulos blancos; recuento absoluto de neutrófilos <500 /mm^3, Anemia hemolítica, Debilidad, Dolor de pecho, Perversión del gusto, nerviosismo.

Precauciones de uso: Debe ser administrado con alimentos.
Toxicidad embriofetal, defectos de nacimiento, aborto espontáneo o muerte fetal pueden ocurrir. Los pacientes deben tener una prueba de embarazo negativa antes de la terapia y usar métodos anticonceptivos y someterse a pruebas de embarazo periódicas.
Los pacientes que presenten las siguientes condiciones deben ser monitoreados de cerca y puede requerir una reducción de la dosis o la interrupción de la terapia:
La anemia hemolítica puede ocurrir con una caída inicial significativa en hemoglobina.

Pancreatitis.
Síntomas pulmonares, que incluyen disnea, infiltrados pulmonares, neumonitis, hipertensión pulmonar y neumonía, así como infiltrados pulmonares o alteración de la función pulmonar han sido reportados.
Trastornos oftalmológicos nuevos o que empeoran.
Disminuciones severas en los recuentos de neutrófilos y plaquetas, y anomalías hematológicas, endocrinas (p. ej., hormona estimulante de la tiroides) y hepáticas.
Trastornos dentales/periodontales informados con la terapia combinada.
Administración concomitante de azatioprina debido a la posible aparición de pancitopenia y supresión de la médula ósea.
Pérdida de peso e inhibición del crecimiento informados durante la combinación de la terapia en pacientes pediátricos. Inhibición del crecimiento a largo plazo (altura)ha sido reportado en algunos pacientes.
No se permite la monoterapia con ribavirina.

Esterilidad:
Basado en datos de animales, la droga puede afectar la fertilidad masculina; en estudios con animales, estos efectos fueron en su mayoría reversibles a los pocos meses de suspender el fármaco.

Contraindicaciones: Mujeres que están o pueden quedar embarazadas.
Hombres cuyas parejas femeninas están embarazadas.
Reacciones de hipersensibilidad conocidas a la ribavirina (p. ej., síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, eritema multiforme).
Hepatitis autoinmune.
Hemoglobinopatías (p. ej., talasemia mayor, anemia de células falciformes).
Aclaramiento de creatinina <50 ml/min.
Coadministración con didanosina.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.