Ganciclovir, cápsula, 250 mg, vía oral, código IGSS: 139

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Prevención de la enfermedad por citomegalovirus en receptores de trasplantes de órganos sólidos y en individuos con infección avanzada por el virus de inmunodeficiencia humana en riesgo de desarrollar enfermedad por citomegalovirus.
Alternativa a la formulación intravenosa para el mantenimiento del tratamiento de la retinitis por citomegalovirus en pacientes inmunocomprometidos, incluidos los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en quienes la retinitis es estable después de la terapia de inducción adecuada y para quienes tienen el riesgo de una progresión más rápida equilibrado con el beneficio asociado con evitar las infusiones intravenosas diarias.

Reacciones adversas: Fiebre, infección, escalofríos, sepsis, diarrea, anorexia, vómitos, leucopenia, anemia, trombocitopenia, neuropatía, sudoración, prurito, infección del catéter, catéter sepsis.

Precauciones de uso:,No debe administrarse ganciclovir si el recuento absoluto de neutrófilos es inferior a 500 células/µL o el recuento de plaquetas es inferior a 25 000 células/µL.
Se han observado anemia y trombocitopenia en pacientes tratados con ganciclovir. utilizarse con precaución en pacientes con citopenias preexistentes o con antecedentes de reacciones citopénicas a otros fármacos, productos químicos o irradiación.
Granulocitopenia generalmente ocurre durante la primera o segunda semana de tratamiento, pero puede ocurrir en cualquier momento durante el tratamiento.

Se considera probable que el ganciclovir a las dosis recomendadas provoque una inhibición temporal o permanente de espermatogénesis.
Se debe recomendar a las personas en edad fértil que utilicen métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento, debido al potencial mutagénico y teratogénico.
Ajuste de dosis en pacientes con función renal deteriorada.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a ganciclovir o aciclovir.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.