Famciclovir, tableta, 250 mg, vía oral, código IGSS: 78

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Pacientes adultos inmunocompetentes:
Tratamiento del herpes labial recurrente en pacientes adultos
Tratamiento de episodios recurrentes de herpes genital
Terapia de supresión crónica de episodios recurrentes de herpes genital en pacientes adultos.
Tratamiento del herpes zoster en pacientes adultos.
Pacientes adultos infectados por el VIH.
Tratamiento de episodios recurrentes de herpes orolabial o genital.

Reacciones adversas: Dolor de cabeza, náuseas, diarrea, dolor abdominal, dismenorrea, vómitos, flatulencia, prurito, erupción, parestesia, neutropenia, aumento de transaminasas, aumento de bilirrubina, fatiga, artralgia, confusión, mareo, eritema multiforme, alucinaciones, ictericia, rigores, trombocitopenia, infección del tracto respiratorio superior.

Precauciones de uso: Puede administrarse con o sin alimentos.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o excipientes, o a penciclovir.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.