Ritonavir, tableta o cápsula, 100 mg, vía oral, código IGSS: 84

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso:
En combinación con otros agentes antirretrovirales para el tratamiento de la infección por VIH-1.

Reacciones adversas: Aumento de triglicéridos, diarrea, náuseas, perversión del gusto, vómitos, debilidad, ggt aumentada, aumento de la creatinina fosfoquinasa, dolor abdominal, anorexia, mareos, dispepsia, eosinofilia, fiebre, flatulencia, dolor de cabeza, insomnio, aumento de ácido úrico, aumento de lft, irritación local de garganta, malestar, mialgia, diaforesis, parestesia, faringitis, erupción, somnolencia, faringitis, supresión suprarrenal, isquemia cerebral, demencia, edema, leucopenia, taquicardia, colitis ulcerosa.

Precauciones de uso: Administrar con alimentos.
Vigilar la función hepática antes y durante la terapia, especialmente en pacientes con enfermedad hepática subyacente, incluyendo hepatitis B y hepatitis C, o elevaciones marcadas de transaminasas, debido a la posible hepatotoxicidad.
Riesgo de desarrollar pancreatitis y en algunos casos ha sido fatal. Pacientes con VIH avanzado presentan mayor riesgo de padecer hipertrigliceridemia y pancreatitis.
Se han informado reacciones alérgicas que incluyen anafilaxia, necrólisis epidérmica tóxica, Stevens-Johnson, broncoespasmo y angioedema. Suspender el tratamiento si se desarrollan reacciones graves.

La prolongación del intervalo PR puede ocurrir en algunos pacientes. Posibles bloqueos cardíacos de segundo y tercer grado. Precaución con los pacientes con enfermedad preexistente del sistema de conducción, cardiopatía isquémica, miocardiopatía, cardiopatía estructural subyacente o cuando se administra con otros fármacos que pueden prolongar el intervalo PR.

Elevaciones de colesterol total y triglicéridos: monitoree antes de la terapia y periódicamente a partir de entonces.

Los pacientes pueden desarrollar una nueva aparición o exacerbaciones de la diabetes mellitus e hiperglucemia.

Posible desarrollo del síndrome de reconstitución inmune al igual que con otros antirretrovirales.

Los pacientes pueden desarrollar redistribución/acumulación de grasa corporal.

Posible aumento del sangrado, incluidos hematomas cutáneos espontáneos y hemartrosis, en pacientes con hemofilia tipo A y B tratados con inhibidores de la proteasa.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad conocida al ritonavir (p. ej., necrólisis epidérmica tóxica, síndrome de Stevens-Johnson).

Coadministración con fármacos altamente dependientes de CYP3A para su eliminación o que reducen significativamente el ritonavir.

Está contraindicada la coadministración de ritonavir con los siguientes fármacos: alfuzosina, amiodarona, flecainida, propafenona, quinidina, voriconazol, rifampicina, dihidroergotamina, ergotamina, metilergonovina, cisaprida, lomitapida, lovastatina, simvastatina, lurasidona, apalutamida, pimozida, sildenafil para la hipertensión arterial pulmonar, triazolam, midazolam oral, carbamazepina, ranolazina, dronedarona, flecainida, colchicina, fenobarbital, fenitoína y hierba de San Juan.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.