Darunavir etanolato, tableta, 600 mg, vía oral, código IGSS: 10519

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Coadministrado con ritonavir, en combinación con otros agentes antirretrovirales, está indicado para el tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana en pacientes adultos y pediátricos de 3 años de edad y mayores.

Reacciones adversas: Aumento del colesterol total, aumento de triglicéridos, diarrea, dolor de cabeza, erupción, dolor abdominal, náuseas, vómitos, anorexia fatiga.

Precauciones de uso: No se recomienda el uso en pacientes con daño hepático.
Vigilar la función hepática antes y durante la terapia, especialmente en pacientes con hepatitis crónica subyacente, cirrosis, o en pacientes que tienen elevaciones previas al tratamiento de transaminasas.
Reacciones cutáneas que varían de leves a graves, incluido Síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, erupción medicamentosa con eosinofilia y síntomas sistémicos y pustulosis exantemática aguda generalizada. Interrumpa el tratamiento si se desarrolla una reacción grave.
Precaución en pacientes con alergia conocida a las sulfonamidas.
Los pacientes pueden desarrollar diabetes mellitus o hiperglucemia de nueva aparición, redistribución/acumulación de grasa corporal o síndrome de reconstitución inmune.
Pacientes con hemofilia pueden desarrollar un aumento de los eventos de sangrado.
No se recomienda en pacientes pediátricos menores de 3 años debido a la toxicidad.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad
Coadministración de darunavir/ritonavir con:
Sustratos concomitantes de CYP3A4 que son tóxicos en exceso.
Inductores potentes simultáneos de CYP3A4 (p. ej., hierba de San Juan, rifampicina).
Antagonista alfa-1: alfuzosina.
Agentes cardiovasculares: ranolazina, ivabradina, dronedarona.
Antigotosos: Colchicina (en pacientes con insuficiencia renal y/o hepática).
Antimicobacteriano: Rifampicina.
Antipsicóticos: lurasidona, pimozida.
Derivados del cornezuelo de centeno (p. ej., dihidroergotamina, ergotamina, metilergonovina).
Agente de motilidad gastrointestinal: Cisaprida.
Producto a base de plantas: Hierba de San Juan (Hypericum perforatum).
Antiviral de acción directa contra la hepatitis C: Elbasvir/grazoprevir.
Agentes modificadores de lípidos: Lomitapida, lovastatina, simvastatina.
Inhibidor de la fosfodiesterasa-5: Sildenafil (utilizado para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar).
Sedantes/hipnóticos: vía oral; midazolam, triazolam.
Antagonista opioide: Naloxegol.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.