Zidovudina, suspensión o jarabe, 50 mg/5 ml, frasco 100 ml - 240 ml, vía oral, código IGSS: 141

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Inhibidor de la transcriptasa inversa, nucleósido, para uso en combinación con otros agentes antirretrovirales para el tratamiento de la infección por virus de inmunodeficiencia tipo 1 y prevención de la transmisión vertical.

Reacciones adversas: Anemia, anorexia, diarrea, fiebre, granulocitopenia, dolor de cabeza, severo, leucopenia, náuseas, dolor, erupción, vómitos, debilidad, malestar, mareos, insomnio, somnolencia, hiperpigmentación de las uñas (marrón azulado), dispepsia, cambios en el recuento de plaquetas, parestesia.

Precauciones de uso: Asociado con toxicidad hematológica incluyendo neutropenia y anemia severa, particularmente en pacientes con enfermedad avanzada por virus de inmunodeficiencia tipo 1. El uso prolongado de zidovudina se ha asociado con miopatía sintomática.
Se han descrito acidosis láctica y hepatomegalia grave con esteatosis, incluidos casos mortales con el uso de análogos de nucleósidos solos o en combinación.
Exacerbación de la anemia en pacientes coinfectados con virus de inmunodeficiencia humana tipo 1/ virus de hepatitis C que reciben ribavirina y zidovudina.
Descompensación hepática (algunas fatales) en pacientes coinfectados virus de inmunodeficiencia humana tipo 1/ virus de hepatitis C que reciben terapia antirretroviral combinada e interferón alfa con/sin ribavirina. El síndrome de

reconstitución inmunitaria y la lipoatrofia se han informado en pacientes tratados con terapia antirretroviral combinada.

Contraindicaciones: Pacientes que han tenido una amenaza potencialmente mortal reacción de hipersensibilidad (por ejemplo, anafilaxia, síndrome de Stevens-Johnson) a cualquiera de los componentes de las formulaciones.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.