Lamivudina, tableta o cápsula, 150 mg, vía oral, código IGSS: 80

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: En combinación con otros agentes antirretrovirales, está indicado para el tratamiento de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana.

Reacciones adversas: Tos, diarrea, fatiga y malestar, fiebre, dolor de cabeza, dolor musculoesquelético, náuseas, neuropatía del sistema nervioso, pancreatitis, Neuropatía periférica, vómitos, calambres abdominales, dolor abdominal, anorexia y/o disminución del apetito, artralgia, escalofríos, depresión, mareo, dispepsia, insomnio, mialgia, erupción, trombocitopenia, creatina fosfoquinasa aumentada.

Precauciones de uso: Aparición de pacientes resistentes a lamivudina con variantes del virus de la hepatitis B asociadas con antirretrovirales que contienen lamivudina.
Acidosis láctica y hepatomegalia severa con esteatosis, incluso fatal con el uso de análogos de nucleósidos.

Usar con precaución en pacientes pediátricos con antecedentes de pancreatitis u otros factores de riesgo significativos para la pancreatitis. Síndrome de reconstitución inmunitaria en pacientes tratados con terapia antirretroviral combinada.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.