Lamivudina, solución oral, 10 mg/ ml, frasco 100 - 240 ml, vía oral, código IGSS: 146

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: En combinación con otros agentes antirretrovirales, está indicado para el tratamiento de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana.

Reacciones adversas: Tos, diarrea, fatiga y malestar, fiebre, dolor de cabeza, dolor musculoesquelético, náuseas, neuropatía del sistema nervioso, pancreatitis, Neuropatía periférica, vómitos, Calambres abdominales, dolor abdominal, anorexia y/o disminución del apetito, artralgia, escalofríos, depresión, mareo, dispepsia, insomnio, mialgia, erupción, trombocitopenia, creatina fosfoquinasa aumentada.

Precauciones de uso: Aparición de pacientes resistentes a lamivudina con variantes del virus de la hepatitis B asociadas con antirretrovirales que contienen lamivudina.
Acidosis láctica y hepatomegalia severa con esteatosis, incluso fatal con el uso de análogos de nucleósidos.
Usar con precaución en pacientes pediátricos con antecedentes de pancreatitis u otros factores de riesgo significativos para la pancreatitis.
Síndrome de reconstitución inmunitaria en pacientes tratados con terapia antirretroviral combinada.
Tasas más bajas de supresión virológica en pacientes con terapia oral.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.