Amoxicilina, polvo para suspensión 250 mg/5 ml, frasco 100 ml - 120 ml, vía oral, código IGSS: 107

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de las siguientes infecciones en adultos y niños: Sinusitis bacteriana aguda, otitis media aguda, amigdalitis y faringitis estreptocócica aguda,,exacerbación aguda de bronquitis crónica, neumonía adquirida en la comunidad, cistitis aguda, bacteriuria asintomática en el embarazo, pielonefritis aguda, fiebre tifoidea y paratifoidea, abcesos dentales con celulitis diseminada, infección protésica articular, erradicación de Helicobacter pylori, enfermedad de Lyme y profilaxis de endocarditisErradicación de Helicobacter pylori.
Enfermedad de Lyme.

Reacciones adversas: Anafilaxia, anemia, elevación aspartato aminotransferasa/alanina aminotransferasa., candidiasis mucocutánea, diarrea, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, erupción, colitis pseudomembranosa, reacciones similares a la enfermedad del suero.

Precauciones de uso: Reacciones de hipersensibilidad:
confirmar si ha habido una reacción de hipersensibilidad previa a penicilinas, cefalosporinas u otros agentes betalactámicos.
Microorganismos no sensibles:
No es adecuada para el tratamiento de algunos tipos de infecciones. Esto aplica particularmente cuando se considere el tratamiento de pacientes con infecciones del tracto urinario e infecciones graves de oído, nariz y garganta.
Convulsiones en pacientes con la función renal alterada o en aquellos que reciben dosis altas o en pacientes con factores que hagan que tengan predisposición.

Pueden aparecer reacciones cutáneas como eritema febril generalizado o erupción morbiliforme (pacientes con mononucleosis).
Se ha observado la reacción de Jarisch-Herxheimer tras el tratamiento de enfermedad de Lyme con amoxicilina. El uso prolongado puede provocar un sobrecrecimiento de microorganismos no sensibles. En tratamientos prolongados se haga una evaluación periódica de las funciones orgánicas, que incluyan la renal, hepática y hematopoyética. Monitorizar el tiempo de protrombina cuando se prescriban anticoagulantes de forma concomitante.
Durante la administración de dosis elevadas de amoxicilina se aconseja mantener una ingesta de líquidos y una diuresis adecuadas, a fin de reducir la posibilidad de aparición de cristaluria a causa de la amoxicilina. En pacientes con catéteres en la vejiga se debe realizar un control periódico para comprobar la permeabilidad del catéter.
Niveles elevados de amoxicilina en suero y orina puedan afectar ciertos ensayos de laboratorio (glucosa en orina y estriol en mujeres embarazadas).

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo, a cualquiera de las penicilinas o a alguno de los excipientes
Antecedentes de una reacción de hipersensibilidad inmediata grave (ej. anafilaxis) a otro agente betalactámico (p. ej. una cefalosporina, carbapenem o monobactam).

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.