Carbamazepina, tableta de liberación prolongada 400 mg, vía oral, código IGSS: 852

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Indicada como droga anticonvulsivante: crisis parciales con sintomatología compleja, convulsiones tónico-clónicas generalizadas y patrones mixtos de convulsiones que incluyen las antes mencionadas u otras convulsiones parciales o generalizadas. También está indicado para el tratamiento del dolor asociado a neuralgia del trigémino, beneficios en la neuralgia glosofaríngea.

Reacciones adversas: Anemia aplásica, agranulocitosis, pancitopenia, depresión de la médula ósea, trombocitopenia, leucopenia, leucocitosis, eosinofilia, porfiria intermitente aguda, porfiria variegata, porfiria cutánea tardía, necrólisis epidérmica tóxica, síndrome de Stevens-Johnson, pustulosis exantemática generalizada aguda, erupciones pruriginosas, eritematosas, urticaria, reacciones de fotosensibilidad, alteraciones en la pigmentación de la piel, dermatitis exfoliativa, eritema multiforme y nudoso, púrpura, empeoramiento del lupus eritematoso diseminado, alopecia, diaforesis, onicomadesis e hirsutismo, insuficiencia cardíaca congestiva, edema, agravamiento de la hipertensión, hipotensión, síncope y colapso, agravamiento de la enfermedad arterial coronaria, arritmias y bloqueo AV, tromboflebitis, tromboembolismo y adenopatía o linfadenopatía, alteraciones en las pruebas de función hepática, ictericia colestásica y hepatocelular, hepatitis, casos muy raros de falla hepática, pancreatitis, hipertensión pulmonar, disnea, neumonitis o neumonía, frecuencia urinaria, retención urinaria aguda, oliguria con presión arterial elevada, azotemia, insuficiencia renal e impotencia, albuminuria, glucosuria, BUN elevado y depósitos microscópicos en el también se han reportado orina, alteración de la fertilidad masculina y/o anomalías espermatogénesis, mareos, somnolencia, alteraciones de la coordinación, confusión, dolor de cabeza, fatiga, visión borrosa

visión, alucinaciones visuales, diplopía transitoria, alteraciones oculomotoras, nistagmo, alteraciones del habla, movimientos involuntarios anormales, neuritis periférica y parestesias, depresión con agitación, locuacidad, tinnitus, hiperacusia, síndrome neuroléptico maligno, náuseas, vómitos, molestias gástricas y dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, anorexia y sequedad de boca y faringe, incluyendo glositis y estomatitis, opacidades dispersas del cristalino cortical punteado, aumento de la presión intraocular, conjuntivitis, dolor en las articulaciones y los músculos, calambres en las piernas, fiebre y escalofríos.

Precauciones de uso: Debe usarse con precaución en pacientes con un trastorno convulsivo mixto que incluye ausencia atípica convulsiones, ya que en estos pacientes se ha asociado con una mayor frecuencia de convulsión.
La terapia debe prescribirse solo después de una evaluación crítica de beneficio-riesgo en pacientes con antecedentes de cardiopatía.
Alteración de la conducción, incluido el bloqueo cardíaco auriculo ventrilar de segundo y tercer grado; daño cardíaco, hepático o renal; reacción adversa hematológica o de hipersensibilidad a otras drogas, incluidas reacciones a otros anticonvulsivos; o cursos interrumpidos de terapia con carbamazepina.
Se han notificado bloqueos cardíacos auriculo ventricular, incluidos bloqueos de segundo y tercer grado, después del tratamiento.
Se han descrito efectos hepáticos, que van desde ligeras elevaciones de las enzimas hepáticas hasta casos raros de insuficiencia hepática.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad documentada. Historia de supresión de la médula ósea. Administración de inhibidores de la monoaminooxidasa en los últimos 14 días. Coadministración con nefazodona; carbamazepina disminuye los niveles plasmáticos de nefazodona y su metabolito activo.

Coadministración con delavirdina, efavirenz, etravirina, nevirapina, rilpivirina; la carbamazepina induce CYP3A4 y puede reducir sustancialmente la concentración sérica de delavirdina, efavirenz, etravirina, nevirapina, rilpivirina, ictericia, hepatitis.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.