Cloranfenicol/ Dexametasona/ Tetrizolina, solución oftálmica, 0.5%/ 0.1%/ 0.025%, frasco gotero, 5 ml a 10 ml, vía tópico ocular, código IGSS: 2050

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Conjitivitis aguda y crónica de carácter infeccioso, queratitis, inflamaciones de la úvea anterior, esclerotitis y miositis. Oftalmopatía simpática.

Reacciones adversas: Visión borrosa, ardor, sensación de picazón, aumento de la presión intraocular, cataratas, reblandecimiento de la córnea.
Frecuencia no definida (Dexametasona): Cataratas, hipertensión ocular, glaucoma de ángulo abierto.
Frecuencia no definida (Tetrahidrazolina): Irritación, sensación de quemazón, cefalea, tremor, hipertensión, taquicardia, palpitaciones.

Precauciones de uso: No se recomienda utilizar cloranfenicol por más de diez días.
El uso continuo de glucoesteroides puede causar disminución del parénquima corneal o escleral.
Se recomienda utilizar con precaución en pacientes con rinitis seca, hipertiroidismo, enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus y cataras.
La tetrahidrazolina puede causar midriasis.
Lavar las manos antes de utilizar el medicamento.
Evitar tocar el aplicador con la superficie ocular para evitar contaminación cruzada.
Suspender el medicamento si se observan cambios en la visión.

El uso prolongado de dexametasona puede causar hipertensión y/o glaucoma, así como daño al nervio óptico, formación de cataras y defectos visuales.

Los corticoesteroides puedes exacerbar las infecciones purulentas o las dadas por parásitos.
Puede existir infecciones micóticas luego del uso prolongado de corticoesteroides.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad, enfermedades virales incluyendo queratitis por herpes simples, varicela, infección micobacteriana, glaucoma, trastornos graves de la función hepática, ojo seco, lesiones ulcerosas de la córnea.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.