Desloratadina, tableta, 5mg, vía oral, código IGSS: 261

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Desloratadina está indicado en adultos y adolescentes a partir de 12 años de edad para el alivio de los síntomas asociados con: rinitis alérgica y urticaria.

Reacciones adversas:

En ensayos clínicos en un intervalo de indicaciones que incluyen rinitis alérgica y urticaria idiopática crónica, a la dosis recomendada de 5 mg diarios, se notificaron reacciones adversas con desloratadina en un 3% de pacientes más que en los tratados con placebo.

las reacciones adversas más frecuentes, notificadas con una incidencia superior al grupo placebo, fueron cansancio, sequedad de boca y cefalea.

en un ensayo clínico con 578 pacientes adolescentes, de 12 a 17 años de edad, la reacción adversa más frecuente fue la cefalea; que se produjo en el 5.9 % de los pacientes tratados con desloratadina y en el 6.9 % de los pacientes que recibieron placebo.

incremento del apetito, alucinaciones, comportamiento anormal, agresión, estado de ánimo deprimido, cefaleas, mareos, somnolencia, insomnio, hiperactividad, psicomotora, convulsiones, sequedad del ojo, taquicardia, palpitaciones, qt prolongado, boca seca, diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, dispepsia, elevaciones de enzimas hepáticas, aumento de la bilirrubina, hepatitis, ictericia, fotosensibilidad, mialgia, fatiga, reacciones de hipersensibilidad (tales como anafilaxia, angioedema, disnea, prurito, rash y urticaria, astenia, aumento de peso.

Precauciones de uso:

Convulsiones: Desloratadina se debe administrar con precaución en pacientes con antecedentes médicos o familiares de convulsiones, y principalmente en niños pequeños, siendo más susceptibles a desarrollar nuevas convulsiones durante el tratamiento.

En caso de insuficiencia renal grave, desloratadina se deberá utilizar con precaución.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad documentada a desloratadina o a los excipientes.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.