Diclofenaco sódico, tableta o cápsula, 50 mg, vía oral, código IGSS: 926

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de enfermedades reumáticas crónicas inflamatorias; artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, artrosis, reumatismo extraarticular, tratamiento sintomático de ataque agudo de gota, dismenorrea primaria, inflamaciones y tumefacciones postraumáticas.

Reacciones adversas: Edema, náuseas, dolor de cabeza, mareos.

Precauciones de uso: Evitar tratamiento concomitante con otros antiinflamatorios no esteroideos.
Evitar tratamiento concomitante con corticoides sistémicos, anticoagulantes orales dicumarínicos, antiagregantes plaquetarios y antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, así como, el tratamiento prolongado ya que aumenta riesgo el gastrointestinal; hemorragia, ulceración y perforación gástrica o intestinal.
La administración prolongada de antiinflamatorios no esteroideos puede provocar necrosis papilar renal y otras lesiones renales; Los pacientes con mayor riesgo incluyen personas de edad avanzada, aquellos con insuficiencia renal, hipovolemia, insuficiencia cardíaca, disfunción hepática o depleción de sal, y aquellos que toman diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueadores de los receptores de angiotensina. Precaución en pacientes con antecedentes de hipertensión, insuficiencia cardiaca, ya que se asocia a edema y aumento del riesgo cardiovascular; infarto del miocardio o evento cerebrovascular. Administrar con precaución en pacientes con asma prexistente, adultos mayores y pacientes con insuficiencia renal o hepática leve a moderada.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes del medicamento. Antecedente de asma, o reacciones alérgicas posterior a la administración de aspirina u otro antiinflamatorio no esteroideo. En el contexto de cirugía de injerto de derivación de arteria coronaria. Cápsulas de Zipsor están contraindicadas en pacientes con antecedente de hipersensibilidad de la proteína bovina.
Pacientes con enfermedad de Crohn activa, colitis ulcerosa activa, insuficiencia hepática o renal grave, desórdenes de la coagulación, antecedentes de hemorragia gastrointestinal o perforación relacionados con tratamientos anteriores con antiinflamatorios no esteroideos, úlcera, hemorragia, perforación gastrointestinal activa, insuficiencia cardiaca congestiva establecida (clasificación II-IV de la New York Heart Association NYHA), cardiopatía isquémica, enfermedad arterial periférica y/o enfermedad cerebrovascular y en el tercer trimestre del embarazo.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.