Multivitaminas sin flúor, solución oral en gotas, frasco 30 ml, Vía oral, código IGSS: 435

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Prevención y tratamiento de las deficiencias de las vitaminas esenciales en los estados en los que existe mayor demanda de vitaminas en lactantes y niños, como dietas restringidas, alimentación impropia o dificultades en la absorción de estas vitaminas. Suplemento dietético.

Reacciones adversas: Son poco frecuentes rash cutáneo, náuseas y vómitos. Ocasionalmente puede desarrollarse una sensibilidad o intolerancia a la tiamina.

Precauciones de uso: La excesiva dosificación de vitamina A y D2 puede producir hipervitaminosis. Cuando se utilice esta preparación no debe administrarse concomitantemente otros preparados que contengan vitaminas para evitar la sobredosificación.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. Contiene sorbitol, no administrar en pacientes con intolerancia a la fructosa.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.