Nifedipino, tableta, 10 mg, Vía oral, código IGSS: 2109

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Retrasar el parto prematuro inminente en mujeres embarazadas que presenten:
Contracciones uterinas regulares de al menos 30 segundos de duración y con una frecuencia de 4 o más contracciones cada 30 minutos.
Dilatación de cuello uterino de 1 a 3 cm. (0 a 3 cm para mujeres nulíparas) y borrado del cuello uterino en más del 50%.
Edad de al menos 18 años.
Edad gestacional de 24 a 33 semanas completas.
Frecuencia cardiaca fetal normal.

Reacciones adversas: Edema periférico, mareos, enrojecimiento, dolor de cabeza, acidez estomacal, náuseas, calambres musculares, cambio de humor, nerviosismo, tos, disnea, palpitaciones, sibilancias, hipotensión transitoria, urticaria, prurito, estreñimiento, dolor en el pecho.

Precauciones de uso: La administración concomitante con otros fármacos vasoactivos como sulfato magnésico y atosiban se realizará únicamente cuando esté justificado por la edad gestacional, y se realizará siempre bajo estricta supervisión y precauciones especiales de empleo.
Durante la administración se debe monitorizar la frecuencia cardíaca y la tensión arterial materna, así como llevar a cabo un registro carditocográfico externo una hora después de la primera dosis de nifedipino y mantener o repetir según evolución de la dinámica uterina y en todo caso a las 24 horas.

Las pacientes con función hepática alterada deberán ser vigiladas estrechamente, pudiendo ser necesaria una reducción de la dosis.

Los medicamentos con actividad tocolítica como los bloqueantes del canal del calcio se asocian con un incremento del riesgo de edema pulmonar y, por lo tanto, nifedipino debe usarse con precaución en casos de embarazos múltiples y diabetes.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a la nifedipina u otros bloqueadores de los canales de calcio.
Shock cardiogénico.
La administración concomitante con inductores potentes de CYP3A4 (p. ej., rifampicina, rifabutina, fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, hierba de San Juan) reduce significativamente la eficacia de la nifedipina.
Preparación de liberación inmediata (por vía sublingual u oral) para la hipertensión urgente o emergente.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.