Olanzapina, tableta recubierta, 10 mg, Vía oral, código IGSS: 10390

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de la esquizofrenia. Tratamiento del episodio maníaco moderado o grave. Prevención de las recaídas en pacientes con trastorno bipolar que haya respondido a la olanzapina durante un episodio maníaco.

Reacciones adversas: Hipotensión ortostática, ganancia de peso dependiente de la dosis, hipertrigliceridemía, hipercolesterolemia, somnolencia dependiente de la dosis, síndromes extrapiramidales dependientes de la dosis, xerostomía, debilidad, mareo, insomnio, elevación de la enzima alanino aminotransferasa, constipación, dispepsia, hiperprolactinemia, hiperglicemia. hipotensión, hipotensión postural, tremor, astenia, acatisia, parkinsonismo, sincope, paro cardiaco súbito, hiperglicemia, cetoacidosis diabética, pancreatitis hemorrágica, tromboembolismo venoso, enfermedad cerebrovascular, epilepsia, intento suicida, tromboembolismo pulmonar, muerto, síndrome maligno neuroléptico, discinesia tardía.
Reportados post comercialización:
DRESS, caídas, síndrome de piernas inquietas, hipersecreción salival.

Precauciones de uso: No se debe utilizar para psicosis relacionada a la demencia, los adultos mayores con demencia tratados con antipsicóticos tienen un riesgo aumentado de muerte.

No se recomienda su uso en pacientes con psicosis inducida por agonistas dopaminérgicos en enfermedad de Parkinson, ya que se han notificado casos de empeoramiento de la sintomatología.

Los pacientes con riesgo severo de sedación o delirio deben observarse en las primeras horas post administración.

Puede existir una posibilidad de intento suicida en los pacientes con esquizofrenia y bipolaridad I, se debe vigilar a los pacientes en busca de cualquier indicio especialmente si consumen olanzapina con fluoxetina.

Las mujeres de la tercera edad son más propensas a presentar movimientos discinéticos.

Se ha observado neutropenia, leucopenia y agranulocitosis, se debe descontinuar la terapia si se sospecha de alguna de estas alteraciones o si la cuenta absoluta de neutrófilos en menor de 1000/ mm^3

Se han reportado eventos cerebrovasculares e incluso muerte.

Se debe usar con precaución en actividad física extenuante, deshidratación, exposición al calor y medicamentos con efectos anticolinérgicos ya que puede existir una desregulación de la temperatura corporal.

Se debe usar con precaución en pacientes con historia o diagnóstico de retención urinaria.

Puede causar somnolencia, hipotensión postural e inestabilidad sensorial y motora, lo cual puede causar caídas y en consecuencia fracturas o lesiones.

Puede causar alteración del juicio, pensamiento y habilidades motoras, se debe usar con precaución en personas que operan maquinas.

Puede existir aumento de peso e hiperlipidemia, especialmente en adolescentes, se debe evaluar el potencial de riesgo cuando se prescribe a un adolescente.

Los pacientes diabéticos tienen más riesgo de desarrollar hiperglicemia. Se debe evaluar el riesgo-beneficio de iniciar olanzapina en estos pacientes y monitorear sus niveles de glucosa de manera recurrente.

Se han reportado casos de síndrome maligno neuroléptico, entre los síntomas se encuentran; hiperpirexia, rigidez muscular, alteración del estado mensual y evidencia de alteración autonómica. Se debe descontinuar de manera inmediata.

Se han notificado casos de elevación asintomática y transitoria de las transaminasas hepáticas, especialmente al inicio del tratamiento. Los pacientes con condiciones

asociadas a diminución de la función hepática deben ser vigilados y es necesario interrumpir el tratamiento si se diagnostica hepatitis.
Se han notificado prolongaciones del intervalo QTc especialmente en pacientes con edad avanzada, insuficiencia cardiaca congestiva, hipertrofia cardiaca o hipomagnesemia.
Se han notificado casos de tromboembolismo.
Los pacientes con antecedente de convulsiones tienen más riesgo de padecer las mimas con el consumo de olanzapina.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al compuesto. Pacientes con riesgo de glaucoma de ángulo estrecho.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.