# Podofilina en resina de benjui, solución o tintura, 20- 25%, frasco, 10 ml, vía tópica, código IGSS: 1355

**Dosis:** Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

**Indicaciones de uso:** Condiloma acuminado, epiteliomatosis, queratosis superficiales múltiples.

**Reacciones adversas:** Necrosis severa/rasgado anogenital, parafimosis, hiperplasia pseudoepiteliomatosa.
Urticaria, fiebre, parestesias, polineuritis, íleo paralitico, fiebre, leucopenia, trombocitopenia, coma.

**Precauciones de uso:** Solo debe ser aplicado por un médico entrenado. Es necesario limitar la aplicación del fármaco a un área pequeña y por periodos de tiempo cortos. No se recomienda su uso sobre verrugas con tejido inflamado o irritado. Altamente irritante para los ojos y mucosas.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad al principio activo. Pacientes embarazadas y en lactancia. Administración alrededor de los ojos, mucosas, marcas de nacimiento, sobre verrugas extensas o con hemorragia.

**Interacciones:** Consulte el Formulario Terapéutico.

**Embarazo y lactancia:** Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

**Referencia:** Adaptado de Formulario Terapéutico.