Propafenona, tableta, 150 mg, vía oral, código IGSS: 615

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Prolongación del tiempo hasta la recurrencia de fibrilación/aleteo auricular paroxístico asociado con síntomas incapacitantes en pacientes sin cardiopatía estructural.
Prolongación del tiempo hasta la recurrencia de la taquicardia supraventricular paroxística asociada con síntomas incapacitantes en pacientes sin cardiopatía estructural.
Tratamiento de las arritmias ventriculares documentadas, como la taquicardia ventricular sostenida que, en el juicio del médico, son potencialmente mortales.

Reacciones adversas: Sabor inusual, mareos/aturdimiento, nauseas/vómitos, estreñimiento, dolor de cabeza, retraso en la conducción intraventricular, fatiga, visión borrosa, debilidad, disnea, taquicardia de complejo salvaje, bradicardia, palpitaciones, temblor, anorexia, diarrea, ataxia, bloqueo auriculoventricular de primer grado, angina, insuficiencia cardíaca congestiva, dolor de pecho, bradiarritmia, fibrilación auricular, bloqueo de rama del haz, bloqueo auriculoventricular de segundo grado, hipotensión, paro sinusal.

Precauciones de uso: Puede causar arritmias nuevas o empeoradas. Evaluar a los pacientes a través de electrocardiograma antes y durante la terapia.
Evite el uso con otros medicamentos que prolonguen el intervalo QT.
Evite el uso simultáneo de propafenona con un citocromo P450 2D6 (CYP2D6) inhibidor y un inhibidor 3A4.
Puede provocar una insuficiencia cardíaca manifiesta.

Puede causar un bloqueo AV de primer grado relacionado con la dosis u otra conducción disturbios Utilizar únicamente en pacientes con trastornos de la conducción que tengan marcapasos.
Puede afectar a los marcapasos artificiales. Supervisar la función del marcapasos.
Puede provocar agranulocitosis, instruir que informen signos de infección.
Puede exacerbar la miastenia gravis.
Esterilidad: Según estudios en humanos y animales, puede afectar transitoriamente la espermatogénesis en los machos; Se han demostrado disminuciones reversibles en la espermatogénesis en monos, perros y conejos después de dosis intravenosas letales o casi letales del fármaco.
Labor y parto: El riesgo de arritmias puede aumentar durante el trabajo de parto y el parto; los pacientes deben ser monitoreados continuamente para detectar arritmias durante el trabajo de parto y el parto.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.
Bradicardia, asma/trastornos broncoespásticos o enfermedad pulmonar obstructiva grave, hipotensión marcada, shock cardiogénico, trastornos intraventriculares de generación y/o conducción de impulsos, incluido el nódulo sinusal enfermo y el síndrome Bloqueo auriculoventricular (a menos que esté presente un marcapasos artificial), desequilibrio electrolítico, insuficiencia cardíaca congestiva, hipotensión grave, miastenia grave.
Síndrome de Brugada conocido.
Terapia concomitante con ritonavir.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.