Sucralfato, suspensión 1 g/ 5 ml frasco 200 ml-240 ml, vía oral, código IGSS: 210

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento a corto plazo (hasta 8 semanas) de úlcera duodenal activa.

Reacciones adversas: Estreñimiento, diarrea, mareo, boca seca, flatulencia, dolor de cabeza, indigestión, insomnio, náuseas, vértigo, vómitos.

Precauciones de uso: Se han informado episodios de hiperglucemia en pacientes diabéticos. Vigilancia estrecha de la glucemia en pacientes diabéticos. En pacientes con alteraciones renales y pacientes en diálisis debido a que se absorbe aluminio cuando se administra sucralfato; el uso concomitante de este con productos que contienen aluminio puede aumentar la carga.
Se puede producir acumulación de aluminio y toxicidad (osteodistrofia de aluminio, osteomalacia, encefalopatía) se han descrito en pacientes con insuficiencia renal.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad documentada.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.