Warfarina sódica, tableta, 5 mg, vía oral, código IGSS: 665

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Profilaxis y/o tratamiento de trombosis venosas, embolismo pulmonar, complicaciones tromboembólicas asociadas con fibrilación auricular y/o sustitución de válvulas cardíacas.
Después de un infarto de miocardio, ictus o embolización sistémica.

Reacciones adversas: síndrome de embolia de colesterol, hemorragia intraocular, dolor abdominal flatulencia, alopecia, erupción, prurito, alteración del gusto, necrosis tisular, cefalea, letargo, mareo, hematuria, anemia, hepatitis, sangrado del tracto respiratorio, reacción de hipersensibilidad, hemorragia, discrasias sanguíneas, fiebre síndrome del "dedo morado", mayor riesgo de fractura con el uso a largo plazo, calcifilaxis.

Precauciones de uso: Los factores de riesgo de hemorragia: índice internacional normalizado superior a 4, edad de 65 años o más, tiempo protrombina muy variable, antecedentes de hemorragia gastrointestinal, hipertensión, enfermedad cerebrovascular, enfermedad cardíaca grave, anemia, neoplasia maligna, traumatismo, insuficiencia renal, enfermedad concomitante. Medicamentos y terapia de larga duración con warfarina.
Precaución en pacientes con riesgo de hemorragia, necrosis o gangrena.
Los antibióticos y la fiebre pueden cambiar la respuesta a la warfarina.
Tenga precaución en pacientes con insuficiencias prolongadas de vitamina K.
La enfermedad tiroidea puede aumentar la capacidad de respuesta a la warfarina.
El alto consumo de vitamina K puede disminuir el efecto de la warfarina.

Se recomienda un control más frecuente de la anticoagulación en pacientes con función renal comprometida.
La insuficiencia hepática puede afectar la síntesis de factores de coagulación y disminuir el metabolismo de la warfarina; realizar un seguimiento más frecuente de las hemorragias.
Realizar un seguimiento más frecuente de las hemorragias en pacientes de edad avanzada que reciben tratamiento en cualquier situación.

Contraindicaciones: Embarazo, amenaza de aborto, eclampsia y preeclampsia, excepto en mujeres con válvulas cardíacas mecánicas. Tendencias hemorrágicas o discrasias sanguíneas. Cirugía ocular o del sistema nervioso central reciente o prevista o cirugía traumática que resulte en grandes superficies abiertas.
Tendencias hemorrágicas asociadas con hemorragia del sistema nervioso central, aneurismas cerebrales, disección de la aorta, pericarditis y derrames pericárdicos, endocarditis bacteriana y ulceración activa o hemorragia manifiesta del tracto gastrointestinal, genitourinario o respiratorio. Punción espinal y otros procedimientos diagnósticos o terapéuticos con potencial de sangrado incontrolable.
Anestesia de bloqueo mayor regional o lumbar. Hipersensibilidad conocida. Hipertensión maligna. Falta de cooperación por parte del enfermo. Dosis elevadas de antiinflamatorios no esteroideos, miconazol, fenilbutazona, dosis elevada de ácido acetilsalicílico y por extrapolación otros salicilatos a dosis elevadas.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.