Abacavir, tableta, 300 mg, vía oral, código IGSS: 10542

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: En combinación con otros agentes antirretrovirales, están indicados para el tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana.

Reacciones adversas: Náuseas, dolor de cabeza, malestar/fatiga, náuseas y vómitos, reacción de hipersensibilidad, diarrea, dolor musculoesquelético, hipertrigliceridemia, hepática: aspartato aminotransferasa aumentada, depresión fiebre/escalofríos, infecciones respiratorias virales, infecciones de oído/nariz/garganta, erupción, ansiedad, trombocitopenia, reacción anafilactoide, hipertensión pulmonar, eritema multiforme, redistribución/acumulación de grasa corporal, síndrome de stevens-johnson, necrolisis epidérmica toxica, pancreatitis, gama glutamil transferasa aumentada, esteatosis hepática, heptaomegalia, hepatotoxicidad, acidosis láctica, infarto de miocardio.

Precauciones de uso: Reacciones de hipersensibilidad graves y a veces mortales. Estas reacciones de hipersensibilidad han incluido falla multiorgánica y anafilaxia y típicamente ocurrieron dentro de las primeras 6 semanas de tratamiento, pero pueden ocurrir en cualquier etapa del tratamiento.
Pacientes que portan el alelo HLA-B*5701 tienen un mayor riesgo de reacciones de hipersensibilidad.
Acidosis láctica y hepatomegalia severa con esteatosis, incluso fatal se han notificado casos con el uso de análogos de nucleósidos.

Se ha notificado síndrome de reconstitución inmunitaria en pacientes tratados con terapia antirretroviral combinada.

Contraindicaciones: Reacción de hipersensibilidad previa a abacavir
Presencia del alelo HLA-B*5701
Insuficiencia hepática moderada o grave.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.