Tenofovir, tableta, 300 mg, vía oral, código IGSS: 2121

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: En combinación con otros agentes antirretrovirales para el tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 en adultos y pacientes pediátricos de 2 años de edad y mayores que pesen al menos 10 kg.
Tratamiento del virus de la hepatitis B crónica en adultos y niños. Pacientes de 2 años de edad y mayores que pesen al menos 10 kg.

Reacciones adversas: Astenia, diarrea, náuseas, dolor, anorexia, depresión, mialgia, neuropatía periférica, dispepsia, erupción, dolor de cabeza, vómitos, flatulencia, dolor abdominal, neutropenia, aumento de transaminasas.

Precauciones de uso: Evite administrar en uso concurrente o reciente de fármacos nefrotóxicos ya que podría aparecer síndrome de Fanconi o insuficiencia renal.
Ofrecer prueba de anticuerpos del virus de inmunodeficiencia humana a todos los pacientes infectados con el VHB antes de iniciar la terapia
Posible síndrome de reconstitución inmunitaria.
Disminuciones en la densidad mineral ósea por lo que es importante evaluar este parámetro en pacientes con antecedentes de fractura patológica u otro factor de riesgo como la osteoporosis o la pérdida ósea.
Suspender tratamiento en pacientes que desarrollan síntomas o hallazgos de laboratorio sugestivo de acidosis láctica o hepatotoxicidad pronunciada.

Contraindicaciones: Ninguna.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.