Efavirenz, tableta, 600 mg vía oral, código IGSS: 160

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: En combinación con otros agentes antirretrovirales está indicado para el tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 en adultos y en pacientes pediátricos de al menos 3 meses de edad y con un peso mínimo de 3.5 kg.

Reacciones adversas: Colesterol total aumentado, diarrea, lipoproteína de alta densidad aumentada, mareos, erupción, fiebre, depresión, insomnio, tos, vómitos ansiedad, neutropenia, prurito, transaminasas aumentadas, somnolencia, sueños anormales, amilasa aumentada, hiperglucemia, dispepsia, dolor abdominal, anorexia, alucinaciones.

Precauciones de uso: Prolongación del intervalo QTc: Considere alternativas a efavirenz en pacientes que toman otros medicamentos con un riesgo conocido de Torsade de Pointes o en pacientes en mayor riesgo de padecer Torsade de Pointes. Síntomas psiquiátricos graves han sido reportados por lo que se requiere una evaluación médica inmediata para síntomas psiquiátricos graves como depresión severa o ideación suicida.
Síntomas del sistema nervioso son frecuentes y generalmente comienzan 1-2 días después de iniciar la terapia y se resuelve en 2-4 semanas. Dosificación a la hora de acostarse puede mejorar la tolerabilidad.
Evitar la administración en el primer trimestre de embarazo ya que puede ocurrir daño fetal.
Controle las pruebas de función hepática antes y durante el tratamiento en pacientes con enfermedad hepática subyacente, incluida la hepatitis B o C coinfección,

elevaciones marcadas de transaminasas o que están tomando medicamentos asociado con toxicidad hepática.
La erupción generalmente comienza dentro de 1 a 2 semanas después de iniciar la terapia y se resuelve en 4 semanas.
Precaución en pacientes con historial de convulsiones.
Colesterol total y elevaciones de triglicéridos. Monitorear antes de la terapia y periódicamente a partir de entonces.
Posible síndrome de reconstitución inmunitaria.
Se ha observado redistribución/acumulación de grasa corporal.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad clínicamente significativa previamente demostrada (p. ej., síndrome de Stevens-Johnson, eritema multiforme o erupciones cutáneas tóxicas)
Coadministración de efavirenz con elbasvir y grazoprevir.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.