Tenofovir/ Emtricitabina, tableta, 300 mg/ 200 mg, vía oral, código IGSS: 2122

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Indicado en combinación con otros agentes antirretrovirales para el tratamiento de la infección por el VIH-1 en adultos y pacientes pediátricos que pesan al menos 17 kg.
Adultos y adolescentes que pesan al menos 35 kg para la profilaxis preexposición para reducir el riesgo de infección por VIH-1 adquirida sexualmente.

Reacciones adversas: Diarrea, náuseas, fatiga, dolor de cabeza, mareo, depresión, insomnio, sueños anormales, erupción, diarrea, náuseas, fatiga, depresión, sinusitis, infecciones del tracto respiratorio superior, mareos, evento de erupción, dolor de cabeza, nasofaringitis, insomnio, vómitos.

Precauciones de uso: Acidosis láctica y hepatomegalia grave con esteatosis, incluidos casos mortales, notificados con análogos de nucleósidos, como emtricitabina y tenofovir; suspender la dosis en aquellos que presenten hallazgos clínicos o de laboratorio sugestivos de acidosis láctica o hepatotoxicidad pronunciada.
No coadministrar con otros medicamentos que contengan emtricitabina o tenofovir.
Puede ocurrir una exacerbación grave de la hepatitis B al suspender el tratamiento.
Se ha informado de síndrome de reconstitución inmunitaria con TAR combinado; durante la fase inicial del tratamiento, los pacientes cuyos sistemas inmunitarios responden pueden desarrollar una respuesta inflamatoria a infecciones oportunistas indolentes o residuales (p. ej., infección por Mycobacterium avium, citomegalovirus, neumonía por Pneumocystis jirovecii [PCP] o tuberculosis); también se han

informado trastornos autoinmunes (p. ej., enfermedad de Graves, polimiositis y síndrome de Guillain-Barré).

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.
No usar como profilaxis preexposición en personas infectadas por el VIH o personas con estado serológico desconocido.
Uso como monoterapia en pacientes infectados por el VIH.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.