Enfuvirtide, polvo para solución inyectable, 90 mg/ ml, vial, vía subcutánea, código IGSS: 1966.

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: En combinación con otros agentes antirretrovirales está indicado para el tratamiento de la infección por virus de inmunodeficiencia humana en pacientes con tratamiento previo con evidencia de replicación del virus de inmunodeficiencia humana a pesar de la terapia antirretroviral en curso.

Reacciones adversas: Dificultad de separar del régimen de fondo**,** prescripción en múltiples sitios de inyección, dolor y malestar, eritema, induración, nódulos y quistes, prurito, equimosis, diarrea, náuseas, fatiga, neuropatía periférica, insomnio, dificultad para de separar del régimen de fondo, astenia, depresión, prurito, dolor abdominal, anorexia, disminución del apetito, pérdida de peso, mialgia, tos, herpes simple, enfermedad similar a la influenza, neumonía, sinusitis, linfadenopatía, pancreatitis, angina inestable, hepatitis toxica, insuficiencia renal, dificultad respiratoria, síndorme de guillain-barré, hipersensibilidad, reacción primaria del complejo inmune, intento de suicidio.

Precauciones de uso: Reacciones en el sitio de inyección como dolor y malestar, induración, eritema, nódulos y quistes, prurito y equimosis.
Los pacientes que reciben anticoagulantes o las personas con hemofilia u otros trastornos de la coagulación pueden tener un mayor riesgo de sangrado posterior a la inyección.
Pacientes con infección por virus de inmunodeficiencia humana debe controlarse cuidadosamente para detectar signos y síntomas de neumonía.

Reacciones de hipersensibilidad como sarpullido, fiebre, náuseas y vómitos, escalofríos, escalofríos, hipotensión y/o transaminasas hepáticas séricas elevadas, dificultad respiratoria, glomerulonefritis y síndrome de Guillain-Barré. Pacientes que desarrollen signos y síntomas sugestivos de una reacción de hipersensibilidad sistémica debe suspender el tratamiento.
Posibilidad de desarrollar síndrome de reconstitución inmune en pacientes que reciben terapia antirretroviral.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.