Raltegravir, tableta, 400 mg, vía oral, código IGSS: 2116

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: En combinación con otros agentes antirretrovirales para el tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana en pacientes adultos y niños con peso de al menos 2 kg.

Reacciones adversas: Alanina aminotransferasa sérica, Aspartato aminotransferasa sérica, Prueba de glucosa sérica en ayunas, Bilirrubina sérica total, Dolor de cabeza, Insomnio, Náuseas, Fosfato alcalino sérico, Mareos, Fatiga Creatinina, Hemoglobina, Recuento de plaquetas.

Precauciones de uso: Reacciones cutáneas graves, potencialmente mortales y mortales como síndrome de Stevens-Johnson, reacción de hipersensibilidad y necrólisis epidérmica tóxica. interrumpir el tratamiento si ocurre hipersensibilidad severa, sarpullido severo o sarpullido con síntomas sistémicos o si ocurren elevaciones de aminotransferasas hepáticas; monitorear estrechamente el estado clínico, incluyendo aminotransferasas.
Puede ocurrir síndrome de reconstitución inmune en pacientes que reciben terapia antirretroviral.

Contraindicaciones: Ninguna.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.