Maraviroc, tableta, 150 mg, vía oral, código IGSS: 10543

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: En combinación con otros agentes antirretrovirales para el tratamiento de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 con tropismo CCR5 en adultos y niños que pesan al menos 2 kg.

Reacciones adversas: Infecciones de las vías respiratorias superiores, artritis y s/s musculoesquelético, tos, pirexia, erupción, fiebre, mareos, trastorno del apetito, infección por herpes, bronquitis, sinusitis, estreñimiento, trastorno de las glándulas apocrinas y ecrinas, parestesia/disestesia, trastorno renal/urinario, depresión, conciencia alterada, neuropatías periféricas, prurito, anormalidades sensoriales, foliculitis, hipertensión, lipodistrofia, dolor muscular, gripe, neumonía
condiloma acuminado, dermatitis/eccema, dispepsia, dolor gastrointestinal, estomatitis/ulceración, trastorno cardiaco, accidente cerebrovascular e ictus, cirrosis hepática, falla hepática, neoplasias, colitis por c. difficile, meningitis viral, neumonía, shock séptico, miositis, osteonecrosis, rabdomiólisis.

Precauciones de uso: Hepatotoxicidad acompañada de erupción grave o reacción alérgica sistémica, incluyendo eventos potencialmente mortales. Monitorear antes y durante el tratamiento parámetros de laboratorio que incluyen alaninaaminotransferasa, aspartatoaminotransferasa y bilirrubina.
Si ocurre erupción o síntomas o signos de hepatitis o se desarrolla una reacción alérgica, los parámetros de laboratorio hepáticos deben ser evaluados y se debe considerar la interrupción del tratamiento. En pacientes con problemas hepáticos preexistentes o que están coinfectados con el virus de la hepatitis B y/o C, se puede justificar un control adicional.

Reacciones cutáneas y de hipersensibilidad (síndrome de Stevens-Johnson, epidérmico tóxico necrólisis y erupción medicamentosa con eosinofilia y síntomas sistémicos graves y potencialmente mortales con el uso concomitante con otros medicamentos asociados con estas reacciones. Suspender si hay signos o síntomas de piel grave o hipersensibilidad que pueden incluir sarpullido grave o sarpullido acompañado de fiebre, malestar general, dolores musculares o articulares, ampollas, lesiones orales, conjuntivitis, edema facial, hinchazón de labios, eosinofilia, monitorear de cerca el estado clínico, incluidas las aminotransferasas.

Más eventos cardiovasculares, incluyendo isquemia miocárdica y/o infarto, se observaron en sujetos con tratamiento previo que recibieron maraviroc. Puede estar justificado un control adicional.
Si los pacientes con insuficiencia renal grave o enfermedad renal en etapa terminal que reciben maraviroc (sin inductores o inhibidores concomitantes de CYP3A) experimentan hipotensión postural, la dosis de maraviroc debe ser reducida de 300 mg dos veces al día a 150 mg dos veces al día.
Puede ocurrir síndrome de reconstitución inmune en pacientes que reciben tratamiento antirretroviral.
Maraviroc antagoniza el correceptor CCR5 ubicado en algunas células inmunitarias y, por lo tanto, potencialmente podría aumentar el riesgo de desarrollar infecciones.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad.
Insuficiencia renal grave o enfermedad renal terminal (ClCr <30 ml/min) en pacientes que toman inhibidores o inductores potentes de CYP3A4.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.