Abacavir sulfato, solución oral, 20 mg/ ml, frasco 240 ml, vía oral, código IGSS: 100142

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento antirretroviral combinado para el tratamiento de la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana en adultos, adolescentes y niños.

Reacciones adversas: Náuseas, dolor de cabeza, malestar/fatiga, náuseas y vómitos, reacción de hipersensibilidad, diarrea, dolor musculoesquelético, hipertrigliceridemia, hepático: ast aumentada, depresión, fiebre/escalofríos, infecciones respiratorias virales, infecciones de oído/nariz/garganta, erupción, ansiedad, trombocitopenia, reacción anafilactoide, hipertensión pulmonar, eritema multiforme, redistribución/acumulación de grasa corporal, síndrome de stevens-johnson, necrolisis epidérmica toxica, pancreatitis, gamma-glutamil transferasa aumentó, esteatosis hepática, hepatomegalia, hepatotoxicidad, acidosis láctica.

Precauciones de uso: Reacciones de hipersensibilidad graves y a veces mortales, con afectación de múltiples órganos, mayor probabilidad en pacientes portadores del alelo HLA-B*5701.

Contraindicaciones: Reacción previa de hipersensibilidad al abacavir, presencia del alelo HLA-B*5701, insuficiencia hepática moderada o grave.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.