Desloratadina, jarabe o solución oral 2.5 mg/ 5 ml, frasco 120 ml, vía oral, código IGSS: 10561

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Indicado en rinitis alérgica estacional, rinitis alérgica crónica, urticaria idiopática crónica.

Reacciones adversas: Dolor de cabeza, fiebre, irritabilidad, diarrea, infección de las vías respiratorias superiores, tos, mareos, somnolencia, mareos, fatiga, eritema, erupción maculopapular, dismenorrea, infección del tracto urinario, bronquitis, epistaxis, taquicardia, palpitaciones. reacciones de hipersensibilidad, raras (p. ej., erupción cutánea, prurito, urticaria, edema, disnea y anafilaxia).
hiperactividad psicomotora, trastornos del movimiento (incluyendo distonía, tics y síntomas extrapiramidales), convulsiones. enzimas hepáticas elevadas, incluida la bilirrubina, hepatitis, aumento del apetito.

Precauciones de uso: Reacciones de hipersibilidad que incluyen exantema, prurito, urticaria, se han informado edema, disnea y anafilaxia.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad documentada a desloratadina o loratadina o componentes

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.