Penicilina G benzatínica, polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial. Vía intramuscular, código IGSS: 29

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de infecciones por microorganismos sensibles a la penicilina-G que son susceptibles a los niveles bajos y prolongados de esta forma particular de dosificación.
Las siguientes infecciones generalmente responderán a una dosis adecuada:
Infecciones leves a moderadas del tracto respiratorio superior debido a estreptococos susceptibles.
Infecciones venéreas: sífilis, frambesia, bejel y pinta.
Condiciones médicas en las que la terapia con penicilina G benzatínica está indicada como profilaxis:
Fiebre reumática y/o corea: eficacia en prevenir la recurrencia de estas condiciones.
Seguimiento para la cardiopatía reumática y la glomerulonefritis aguda.

Reacciones adversas: Erupciones cutáneas que incluyen erupciones maculopapulares y dermatitis exfoliativa, urticaria, reacciones similares a la enfermedad del suero (p. ej., escalofríos, fiebre, edema, artralgia, postración), reacción de Jarisch-Herxheimer informada al tratar la sífilis y colitis pseudomembranosa.

Precauciones de uso: No administrar por vía intravenosa.
Reacciones anafilácticas pueden ocurrir, son más probables en individuos con antecedentes de hipersensibilidad a la penicilina.

Antes de iniciar terapia, se debe consultar cuidadosamente con respecto a las reacciones anteriores de hipersensibilidad a las penicilinas, cefalosporinas u otros alérgenos. Si ocurre una reacción alérgica debe suspenderse e iniciar inmediatamente tratamiento de urgencia para manejo de síntomas.

Reacciones adversas cutáneas graves como el síndrome de Stevens-Johnson, tóxicos necrólisis epidérmica, reacción a fármacos con eosinofilia y síntomas sistémicos, y pustulosis exantemática aguda generalizada en pacientes que toman antibióticos betalactámicos. Cuando se sospecha reacciones adversas cutáneas graves, se debe suspender inmediatamente y se debe considerar un tratamiento alternativo.

El tratamiento con agentes antibacterianos altera la flora normal del colon lo que puede ocasionar Diarrea asociada a Clostridium difficile y puede variar en severidad desde diarrea leve hasta colitis fatal. De sospechar diarrea asociada a Clostridium difficile el tratamiento debe descontinuarse.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.