# Vitamina A (Acetato o palmitato de retinol), cápsula, perla o gragea, 25,000 UI, Vía oral, código IGSS: 413

**Dosis:** Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

**Indicaciones de uso:** Prevención y tratamiento de la deficiencia de Vitamina A: Queratomalacia, xeroftalmia y nictalopia (ceguera nocturna).
En la prevención de las complicaciones del sarampión.
Durante estrés ó infecciones prolongadas o fiebre crónica; en Síndrome de mala absorción asociados a insuficiencia pancreática (enfermedad pancreática, fibrosis quística), enfermedad del tracto hepatobiliar (disfunción hepática, cirrosis, ictericia obstructiva), enfermedades del intestino delgado (enfermedad celíaca, esprúe tropical, enteritis regional, diarrea persistente) o postgastrectomía; diabetes mellitus; hipertiroidismo; deficiencia proteica severa.
En pacientes que reciben nutrición parenteral total (TPN) en los que experimentan una rápida pérdida de peso o en aquellos con mal nutrición, debido a su insuficiente ingesta dietética.
Las necesidades pueden aumentar a causa de los siguientes medicamentos: colestiramina, colestipol, aceite mineral, neomicina y sucralfato.

**Reacciones adversas:** Anafilaxis y muerte, dermatitis facial, fragilidad del estrato córneo, conjuntivitis, piel pegajosa, lesiones similares a granulomas en el acné, mucosas secas, paroniquia, opacidades corneales, descamación palmoplantar, queilitis y alopecia.

**Precauciones de uso:** Se debe usar con precaución cuando se administran dosis mayores de 25,000 UI/día.
Siempre se debe evaluar otras hipovitaminosis ya que el padecimiento solo de deficiencia de vitamina A es raro.
Se debe usar con precaución en falla renal.
Grandes cantidades de vitamina A, 100,00 a 300,000 UI/día como tratamiento del acné no ha sido establecido.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad a alguno de los componentes, hipervitaminosis, uso intravenoso, síndrome de mal absorción (en terapia oral), embarazo.

**Interacciones:** Consulte el Formulario Terapéutico.

**Embarazo y lactancia:** Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

**Referencia:** Adaptado de Formulario Terapéutico.