Vitamina K 1 (fitomenadiona), Solución inyectable, 10 mg/ ml, vial o ampolla, 1 ml, vía intravenosa o intramuscular, código IGSS: 422

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Prevención y tratamiento de hipoprotrombinemia causada por deficiencia de vitamina K, por tanto, en: Hemorragias o peligro de hemorragias por hipoprotrombinemia grave debido a:

- Sobredosificación de anticoagulantes.
- Hipovitaminosis K causada por factores de la absorción o síntesis de vitamina K tales como alteraciones intestinales o hepáticas y post tratamiento prolongado con antibióticos, sulfonamidas o salicilatos.

Reacciones adversas: Anafilaxis, disnea, cianosis, erupciones eritematosas, prurito, lesiones tipo esclerodérmicas, hiperbilirrubinemia, hipotensión, reacción en sitio de inyección, alteraciones del gusto, rash, eritema discrómico de Perstans.
Reportados después de su lanzamiento en el mercado: Taquicardia, mareos, disgeusia, eritema, placas prurítica.

Precauciones de uso: En pacientes con alteraciones hepáticas graves es necesario un control cuidadoso del INR después de la administración del medicamento.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo
No debe ser administrado intramuscularmente a pacientes bajo tratamiento anticoagulante. Para su utilización es necesario la retirada del anticoagulante.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.