Nevirapina, tableta o cápsula, 200 mg, vía oral, código IGSS: 100144

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de adultos, adolescentes y niños de cualquier edad infectados por virus de inmunodeficiencia humana.

Reacciones adversas: Diarrea, erupción, dolor de cabeza, neutropenia, fiebre, estomatitis ulcerosa, aumento de las lft, dolor abdominal, parestesia, náuseas, anemia, neuropatía periférica, mialgia, frecuencia no definida, hepatotoxicidad potencialmente mortal (hepatitis fulminante, hepatitis colestásica, insuficiencia hepática, necrosis hepática), síndrome de Stevens-Johnson, necrolisis epidérmica toxica y rabdomiólisis

Precauciones de uso: Monitorear de cerca al paciente durante las primeras 6 semanas y continuar la vigilancia durante las primeras 18 semanas, período de mayor riesgo, se recomiendan medición de enzimas hepáticas de forma mensual.
Suspender si se produce una erupción cutánea grave o cualquier erupción con aumento de transaminasas u otros síntomas o reacción de hipersensibilidad
Riesgo de reacciones cutáneas graves, potencialmente mortales, incluyendo síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica e hipersensibilidad.
Riesgo de síndrome de reconstitución inmunitaria si se utiliza en combinación con otros antirretrovirales.
Riesgo de hepatotoxicidad, síntomas similares a hepatitis, incremento de enzimas hepáticas.
Signos de hipersensibilidad incluyen: Erupción cutánea grave o acompañada de fiebre, malestar general, fatiga, dolores musculares o articulares, ampollas, lesiones

orales, conjuntivitis, edema facial, eosinofilia, granulocitopenia, linfadenopatía o disfunción renal.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad.
Deterioro hepático moderado o grave (Child-Pugh clase B o C).
Coadministración con fármacos que produzcan disminución plasmática de Nevirapina.
Uso como parte de regímenes de profilaxis postexposición.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.