Etravirina, tableta o cápsula, 100 mg, vía oral, código IGSS: 100145

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Administrado conjuntamente con un inhibidor de la proteasa potenciado y con otros medicamentos antirretrovirales, está indicado en el tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana de tipo 1, en pacientes adultos previamente tratados con antirretrovirales y en pacientes pediátricos previamente tratados con antirretrovirales a partir de los 6 años de edad.

Reacciones adversas: Erupción, Náuseas, Aumento del LDL. Trastornos gastrointestinales, Fatiga, Neuropatía periférica, Aumento de creatinina, Diarrea.
Síndrome de Stevens-Johnson, eritema multiforme, angina de pecho, angioedema, necrolisis epidérmica tóxica (incluidos informes de muertes), reacciones de hipersensibilidad (incluidos casos de insuficiencia hepática).

Precauciones de uso: Hipersensibilidad, riesgo de reacciones cutáneas graves (p. ej., síndrome de Stevens-Johnson, eritema multiforme, necrólisis epidérmica tóxica). Se informaron reacciones de hipersensibilidad que incluyen erupción medicamentosa con eosinofilia y síntomas sistémicos; caracterizado por erupción cutánea, hallazgos constitucionales y, a veces, disfunción orgánica.
Suspender si se desarrolla una erupción grave e iniciar la terapia adecuada. Riesgo de síndrome de reconstitución inmune.
Disminución del 50 % en la absorción cuando se administra en ayunas: tomar únicamente con las comidas.
La etravirina es un sustrato de CYP3A, CYP2C9 y CYP2C19; La coadministración con inhibidores o inductores de CYP3A, CYP2C9 y CYP2C19 puede alterar la eficacia o el perfil de reacciones adversas de etravirina.

La etravirina es un inductor de CYP3A y un inhibidor de CYP2C9, CYP2C19 y de la glicoproteína P (Pgp); La coadministración de CYP3A, CYP2C9, CYP2C19 o sustrato de glicoproteína P puede alterar la eficacia o toxicidad de los fármacos coadministrados.

Contraindicaciones: Ninguna.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.