Etravirina, tableta o cápsula, 200 mg, vía oral, código IGSS:100146

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Administrado conjuntamente con un inhibidor de la proteasa potenciado y con otros medicamentos antirretrovirales, está indicado en el tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana de tipo 1 (VIH-1), en pacientes adultos previamente tratados con antirretrovirales y en pacientes pediátricos previamente tratados con antirretrovirales a partir de los 2 años de edad.

Reacciones adversas: Erupción, náuseas, aumento del LDL.
Trastornos gastrointestinales, fatiga, neuropatía periférica, aumento de creatinina, diarrea.
Síndrome de Stevens-Johnson, eritema multiforme, angina de pecho, angioedema, necrólisis epidérmica tóxica (incluidos informes de muertes), reacciones de hipersensibilidad (incluidos casos de insuficiencia hepática).

Precauciones de uso: Lo óptimo es combinar etravirina con otros antirretrovirales que muestren actividad frente al virus del paciente.
Disminución de la respuesta viral a etravirina en pacientes con 3 o más de las siguientes mutaciones virales: V90I, A98G, L100I, K101E/P, V106I, V179D/F, Y181C/I/V y G190A/S.
Se han comunicado casos de síndromes de hipersensibilidad graves, incluyendo Erupción Medicamentosa con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos y necrólisis epidérmica tóxica, algunas veces mortales.
Los síntomas aparecen generalmente alrededor de las 3-6 semanas y en la mayoría de los casos se resuelven favorablemente tras el cese del tratamiento y el inicio

de la terapia con corticoides. El retraso en la interrupción del tratamiento tras la aparición de erupción grave puede provocar una reacción que ponga en riesgo la vida. Los pacientes que han suspendido el tratamiento debido a reacciones de hipersensibilidad no deben reiniciar el tratamiento.

Se han notificado casos de exantema, de intensidad leve a moderada, más frecuente en la segunda semana de tratamiento y, poco frecuente después de la 4ª semana. Generalmente autolimitado y se resolvió en 1 a 2 semanas sin necesidad de interrumpir la terapia. Con mayor incidencia en las mujeres.

El tipo y la incidencia de las reacciones adversas en los pacientes mayores de 55 años fueron similares a las observadas en los pacientes de menos edad.

Precaución en pacientes con insuficiencia hepática moderada, Etravirina se metaboliza y elimina principalmente por el hígado y se une fuertemente a las proteínas plasmáticas. No se recomienda su uso en pacientes con insuficiencia hepática grave (clase C de Child-Pugh).

Precaución en pacientes con coinfección por el virus de la hepatitis B o C, ya que los datos actuales disponibles son limitados.

Durante el tratamiento antirretroviral se puede producir un aumento en el peso y en los niveles de glucosa y lípidos en la sangre.

Los pacientes infectados por el VIH que presentan una inmunodeficiencia grave cuando se inicia el Tratamiento Antirretroviral Combinado, pueden mostrar una reacción inflamatoria frente a patógenos oportunistas asintomáticos o latentes y provocar situaciones clínicas graves o un empeoramiento de los síntomas. Por lo general, estas reacciones se observan en las primeras semanas o meses después del inicio del tratamiento.

Se ha notificado la aparición de trastornos autoinmunitarios durante la reconstitución inmune, el tiempo notificado hasta su aparición es más variable, pueden suceder muchos meses después del inicio del tratamiento.

Se han notificado casos de osteonecrosis en pacientes con VIH avanzada y/o exposición crónica a Tratamiento Antirretroviral Combinado. Informar sobre la presencia de dolor o rigidez en las articulaciones o dificultad del movimiento.
Cada comprimido contiene 40 mg de lactosa monohidrato. Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o problemas de absorción de glucosa o galactosa, no deben tomar este medicamento.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. Administración conjunta con elbasvir/ grazoprevir.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.