Dolutegravir sódico, tableta o cápsula, 50mg, vía oral, código IGSS: 100147

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento en combinación con otros medicamentos antirretrovirales para el tratamiento de adultos, adolescentes y niños de al menos 6 años con un peso de al menos 14kg infectados con el Virus de Inmunodeficiencia Humana.

Reacciones adversas: Elevación del colesterol y triglicéridos.
Aumento de la lipasa, hiperglucemia, aumento de la creatinina, aumento de la AST, insomnio, aumento de la ALT, aumento de la bilirrubina, dolor de cabeza, trastornos gastrointestinales, fatiga, hepatitis, miositis, insuficiencia renal, prurito, náuseas.
Sueños extraños, mareo, diarrea, rash, vértigo.

Precauciones de uso: La actividad del dolutegravir se ve comprometida en cepas virales con mutaciones Q148+≥ 2.
Se han reportado casos de hipersensibilidad caracterizados por rash e incluso falla orgánica e injuria hepática. Si se desarrollan síntomas de hipersensibilidad es importante interrumpir inmediatamente el medicamento.
Se ha observado Síndrome de Reconstitución Inmune con el uso de Dolutegravir, se caracteriza por ser una deficiencia inmunitaria grave y vulnera al paciente frente a patógenos oportunistas latentes o asintomáticos. Se debe vigilar a los pacientes ante cualquier síntoma inflamatorio e instaurar un tratamiento si es necesario.
Se han reportado efectos hepáticos adversos, los pacientes con hepatitis B o C pueden tener un riesgo aumentado de presentar elevación de las transaminasas.
Se han notificado casos de osteonecrosis, se debe consultar a un médico en caso de molestias o dolor articular, rigidez o dificultad para moverse.

El tratamiento antirretroviral puede producir aumento de peso, así como elevación de lípidos y glucosa. Se debe administrar tratamiento de ser necesario.
La toxicidad hepática se ha reportado incluso sin algún antecedente de enfermedad hepática u otros factores de riesgo.
Las diferentes formas farmacéuticas (ej. Tabletas y tabletas para suspensión oral) no son bioequivalentes y no son intercambiables, pudiendo provocar subdosificación y pérdida del efecto terapéutico y posible resistencia.
Los inductores de UGT1A1 y CYP3A disminuyen la acción del dolutegravir.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al compuesto. Coadministración con dofetilida.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.