Abacavir sulfato/ lamivudina, tableta o cápsula, 600mg/ 300 mg, vía oral, código IGSS: 100150

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Está indicado en el tratamiento antirretroviral combinado para el tratamiento de adultos, adolescentes y niños que pesen al menos 25 kg infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana.

Reacciones adversas: Hipersensibilidad, anorexia, cefalea, insomnio, tos, síntomas nasales, náuseas, vómitos, diarrea, dolor o calambres abdominales, erupción, alopecia, artralgia, alteraciones musculares, fiebre, letargo, fatiga.
Neutropenia y anemia, trombocitopenia, aumento transitorio de las enzimas hepáticas (aspartato aminotransferasa, alanina aminotransferasa).
Aumento de la amilasa en suero, pancreatitis, hepatitis, angioedema, rabdomiólisis.
Aplasia eritrocitaria pura, acidosis metabólica, neuropatía periférica (o parestesia).
eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica.

Precauciones de uso: Abacavir puede desencadenar reacciones de hipersensibilidad, potencialmente mortales si no se tratan adecuadamente, caracterizadas por fiebre, erupción y síntomas sistémicos.
Existe un alto riesgo de reacciones de hipersensibilidad en pacientes con el alelo HLA-B*5701. Se recomienda documentar el estatus de este alelo antes de iniciar el tratamiento. Además, se debe interrumpir inmediatamente el tratamiento si se sospecha de reacciones de hipersensibilidad, incluso sin la presencia de HLA-B*5701. No se debe reiniciar el tratamiento con abacavir si se sospecha de

reacciones de hipersensibilidad, ya que puede provocar una reacción más grave, potencialmente mortal.

Los síntomas de reacciones de hipersensibilidad pueden aparecer en las primeras seis semanas del tratamiento y pueden incluir fiebre, erupción y otros síntomas respiratorios y gastrointestinales. Es importante diferenciar estos síntomas de otras enfermedades para evitar un diagnóstico erróneo.

Los síntomas de reacciones de hipersensibilidad suelen mejorar al suspender el tratamiento con abacavir. Sin embargo, en casos raros, pacientes que reinician el tratamiento pueden experimentar reacciones potencialmente mortales. Por lo tanto, se recomienda reiniciar el tratamiento en un entorno con acceso a asistencia médica.

Durante el tratamiento antirretroviral pueden aumentar el peso y los niveles de glucosa y lípidos en la sangre, posiblemente influenciados por el control de la enfermedad y el estilo de vida. Se recomienda monitorear regularmente estos parámetros, y tratar los trastornos lipídicos según sea necesario.

Abacavir y lamivudina pueden estar asociados con reacciones de hipersensibilidad, particularmente en pacientes portadores del alelo HLA-B*5701.

No se recomienda en pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave.

Los pacientes con hepatitis B o C crónica tienen mayor riesgo de reacciones adversas hepáticas graves y potencialmente mortales.

La exposición fetal a análogos de nucleósidos podría afectar la función mitocondrial, y se han observado casos de disfunción neurológica en bebés expuestos *in útero*. Sin embargo, estos hallazgos no alteran las recomendaciones actuales para el tratamiento antirretroviral durante el embarazo.

El tratamiento antirretroviral puede desencadenar síndrome de reconstitución inmune, especialmente en pacientes con inmunodeficiencia grave.

Se ha mostrado una asociación entre el infarto de miocardio y el uso de abacavir.

En pacientes con insuficiencia renal moderada, la exposición a lamivudina puede aumentar, lo que puede requerir ajustes de dosis y se deberá emplear monofármacos para establecer la pauta de tratamiento.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes. Los pacientes que tienen el alelo HLA-B*5701, aquellos con hipersensibilidad
previa a abacavir o lamivudina, y aquellos con deterioro hepático moderado o grave.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.