Efavirenz/ emtricitabina/ tenofovir disoproxil fumarato, tableta o cápsula, 600 mg/ 200 mg/ 300 mg, vía oral, código IGSS:100152

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana-1 en adultos de 18 años de edad o mayores con supresión virológica < 50 copias/ml durante más de tres meses.

Reacciones adversas: Hipercolesterolemia, depresión, mareos, fatiga, insomnio, somnolencia, sueños anormales, erupción, aumento de triglicéridos, hiperglucemia, náuseas, vómitos, aumento de amilasa sérica, neutropenia, aumento de ALT, aumento de la fosfatasa alcalina, aumento de creatinina, hematuria, sinusitis, infección de las vías respiratorias superiores, nasofaringitis, glucosuria.

Precauciones de uso: Utilícese con precaución en pacientes con predisposición a reacciones psicológicas.
Utilícese con precaución en pacientes con antecedentes de convulsiones.
Precaución por Síndrome de reconstitución inmunitaria.
La neurotoxicidad de aparición tardía (ataxia, encefalopatía, alteración de la conciencia, confusión, enlentecimiento psicomotor, psicosis, delirio), puede producirse meses o años después del inicio del tratamiento con Efavirenz, especialmente en pacientes con polimorfismos genéticos CYP2B6, ante sospecha de síntomas neurotóxicos suspender el tratamiento.
Monitorear enzimas hepáticas en pacientes con insuficiencia hepática, suspender ante sospecha de toxicidad hepática.

Exacerbación aguda grave de la hepatitis B en pacientes coinfectados por el Virus de Inmuodeficiencia Humana -1 y el Virus de Hepatitis B.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad.
Administración concomitante con voriconazol o elbasvir/grazoprevir.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.