Bromocriptina mesilato, tableta, 2.5 mg, Vía oral, código IGSS: 91

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Prevención o supresión de la lactancia fisiológica post parto cuando esta clínicamente indicada.
Tratamiento de las alteraciones del ciclo menstrual y trastornos de la fertilidad asociados a hiperprolactinemia.
Tratamiento de la hiperprolactinemia en el varón.
Tratamiento de prolactinomas o macroadenomas que no pueden tratarse con cirugía.
Como tratamiento complementario de la acromegalia y la enfermedad de Parkinson.

Reacciones adversas: Nausea, cefalea, mareo, constipación (en pacientes con acromegalia). Fatiga, vómitos, dolor abdominal, congestión nasal, constipación, diarrea, somnolencia. En personas con acromegalia se han observado: hipotensión ortostática, anorexia, boca seca, indigestión, dispepsia, somnolencia, cansancio, vómitos, hemorragia gastrointestinal, mareo, exacerbación del síndrome de Raynaud, cefalea, sincope.
En pacientes post parto se han reportado: Cefalea, mareo, nausea, vómitos, fatiga, Sincope, diarrea, cólicos.
Frecuentemente no definidos: Nausea, movimientos involuntarios, alucinaciones, confusión, desmayos, astenia, incomodidad abdominal, alteraciones de la vista, ataxia, insomnio, depresión, hipotensión, falta de aire, constipación, vértigo.

Precauciones de uso: Se debe evitar su uso en pacientes con intolerancia a la galactosa, deficiencia severe de lactasa o malabsorción glucosa-galactosa.

Se debe usar con precaución en pacientes con historia de psicosis o enfermedad cardiovascular.

En pacientes bajo tratamiento para macroadenoma relacionada a hiperprolactinemia pueden presentar rinorrea secundaria a fuga de líquido cefalorraquídeo.

Se han reportado cosas de hemorragia gastrointestinal especialmente en aquellos pacientes con ulcera péptica conocida, se recomienda usar con precaución en pacientes con historia de ulcera péptica o hemorragia gastrointestinal.

Las dosis altas de bromocriptina pueden estar relacionadas con confusión mental, los pacientes con parkinson pueden desarrollar leves grados de demencia.

Puede ocasionar alucinaciones visuales o auditivas cuando se administra como monoterapia o en combinación con levodopa, estas suelen resolver con la reducción de la dosis. Se han reportado cosas de hipertensión al inicio de la terapia más frecuentemente durante la segunda semana.

Se han reportado cosas de hipotensión y disminución de la atención por lo que los primeros días es importante que los pacientes tengan precaución al conducir o manejar maquinaria. Se han notificado casos de derrame pleural y pericárdico, así como fibrosis pleural, fibrosis pulmonar y pericarditis constrictiva en pacientes bajo tratamiento a altas dosis durante periodos prolongados.

Se ha notificado fibrosis retroperitoneal, entre los síntomas se puede encontrar dolor de espalda, edema en extremidades inferiores, alteración en la función renal, se debe vigilar a los pacientes que presenten estos síntomas y descontinuar el tratamiento si existe sospecha de cambios fibróticos.

Las mujeres en periodo post parto tienen más riesgo de desarrollar convulsiones, ictus, hipertensión o infarto al miocardio. Es importante vigilarlas durante los primeros días del tratamiento.

Se debe vigilar especialmente a aquellas mujeres que consumen fármacos que alteren la presión sanguínea.

En los pacientes con adenomas secretores de prolactina pueden presentar aumento del tamaño del tumor, estos deben ser estrechamente vigilados.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquier componente. Hipertensión no controlada. Pacientes embarazadas. Mujeres en periodo post parto con historia de enfermedad cardiovascular.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.